

# Глава 2

---

Указатель  
КОМПЛЕКСНЫХ  
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ  
препаратов  
фирмы "Хеель"

В главе приводится описание следующих комплексных гомеопатических антигомтоксических препаратов фирмы “Хеель”, зарегистрированных в России:

Ангин-Хель СД . . . . .	159	Окулохель . . . . .	215
Берберис-Гомаккорд . . . . .	161	Остеохель С . . . . .	216
Бронхалис-Хель . . . . .	162	Плацента композитум . . . . .	218
Валерианухель . . . . .	164	Популюс композитум СР . . . . .	220
Вертигохель . . . . .	166	Псоринухель Н . . . . .	223
Вибуркол . . . . .	168	Пульсатилла композитум . . . . .	225
Галиум-Хель . . . . .	169	Ренель . . . . .	226
Гастрikumель . . . . .	172	Сабаль-Гомаккорд . . . . .	228
Гепар композитум . . . . .	174	Солидаго композитум С . . . . .	229
Гинекохель . . . . .	177	Спаскупрель . . . . .	231
Гирель . . . . .	179	Спигелон . . . . .	233
Гормель СН . . . . .	180	Струмель Т . . . . .	235
Дискус композитум . . . . .	182	Тартефедрель Н . . . . .	237
Дуоденохель . . . . .	186	Тестис композитум . . . . .	238
Калькохель . . . . .	187	Тонзилла композитум . . . . .	241
Климакт-Хель . . . . .	189	Траумель С . . . . .	244
Коэнзим композитум . . . . .	190	Убихинон композитум . . . . .	248
Кралонин . . . . .	193	Хелидониум-Гомаккорд Н . . . . .	251
Кутис композитум . . . . .	195	Хепель . . . . .	252
Лептандра композитум . . . . .	198	Цель Т . . . . .	254
Лимфомиозот . . . . .	199	Церебрум композитум Н . . . . .	257
Люффель . . . . .	202	Швеф-Хель . . . . .	260
Момордика композитум . . . . .	204	Энгистол . . . . .	260
Мукоза композитум . . . . .	206	Эскулюс композитум . . . . .	262
Нервохель . . . . .	210	Эуфорбиум композитум	
Нукс вомика-Гомаккорд . . . . .	211	Назентропфен С . . . . .	265
Овариум композитум . . . . .	213	Эхинацея композитум СН . . . . .	266

## Ангин-Хель СД Angin-Heel SD

Таблетки для рассасывания  
гомеопатические, 50 шт.



### Состав:

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*  
Hydrargyrum bicyanatum D8 30 мг, Phytolacca  
americana D4 30 мг, Apis mellifica D4 30 мг,  
Arnica montana D4 30 мг, Hepar sulfuris D6 60  
мг, Atropa belladonna D4 60 мг.

*Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

### Показания к применению:

Тонзиллит.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства Астровых (Сложноцветных), детский возраст (до 3 лет).

### Применение при беременности и лактации:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 12 лет принимают препарат по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.

При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день). Длительность применения препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7–10 дней до 3–4 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом. Применение препарата у детей от 3 до 12 лет возможно по назначению и под контролем врача.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. После применения препарата Ангин-Хель СД может наблюдаться увеличение слюноотделения; прием препарата в этом случае следует прекратить.

### Передозировка:

При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы.

**Взаимодействие с другими препаратами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При рецидивирующих воспалительных заболеваниях миндалин и устойчивой (в течение более 3 дней) повышенной температуре тела или при ее повышении выше 39°C, а также при всех неясных или устойчивых симптомах следует обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Hydrargyrum bicanatum*

Воспаление миндалин, неба, зева и гортани (дифтерит).

*Phytolacca americana*

Инфекция с высокой температурой. Воспаления слизистых. Очаги хронической инфекции.

*Apis mellifica*

Отечный синдром при воспалительных заболеваниях различной локализации.

*Arnica montana*

Кровотечения; миалгия после перенапряжений; заболевания артериальной и венозной систем.

*Hepar sulfuris*

Гнойное воспаление кожи и слизистых, хроническое гнойное воспаление среднего уха, тонзиллярный абсцесс. Предрасположенность к заболеваниям лимфатической системы. Нервозность.

*Atropa belladonna*

Воспаления миндалин, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов, сопровождающиеся повышением температуры. Воспаления мозговых оболочек, кожи и суставов.

## Берберис-Гомаккорд Berberis-Homaccord

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.



### Состав:

(на 100 г): *Активные компоненты:* Berberis vulgaris D2 0,4 г, Berberis vulgaris D10 0,4 г, Berberis vulgaris D30 0,4 г, Berberis vulgaris D200 0,4 г, Citrullus colocynthis D2 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 0,3 г, Citrullus colocynthis D200 0,3 г, Veratrum album D3 0,3 г, Veratrum album D10 0,3 г, Veratrum album D30 0,3 г, Veratrum album D200 0,3 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

### Показания к применению:

В комплексной терапии при спастических состояниях моче- и желчевыводящих путей на фоне воспалительных заболеваний (цистит, пиелоцистит, холецистит, холангит, желчно- и мочекаменная болезнь).

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

### Применение при беременности и лактации:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Продолжительность курса лечения определяется врачом.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать

прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

#### **Ингредиенты и показания к ним:**

*Berberis vulgaris*

Заболевания гепатобилиарной системы.

*Citrullus colocynthis*

Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы.

*Veratrum album*

Нарастающая недостаточность сердечно-сосудистой системы при инфекционных заболеваниях. Поносы, невралгии. Невротические расстройства с повышенной возбудимостью.

## **Бронхалис-Хель** **Bronchalis-Heel**

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.



#### **Состав:**

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

*Atropa belladonna D4 30 мг, Sticta D4 30 мг,*

*Tartarus stibiatus D4 30 мг, Kreosotum D5 30*

*мг, Ipsecacuanha D4 30 мг, Lobelia inflata D4*

*30 мг, Bryonia cretica D4 60 мг, Hyoscyamus*

*niger D4 60 мг. Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

#### **Показания к применению:**

Отхаркивающее средство при обструктивных и воспалительных заболеваниях дыхательных путей (катар курильщика, хронический бронхит, трахеит).

#### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарат; детский возраст (до 3-х лет).

#### **Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс лечения – 2–3 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом. Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

В редких случаях возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Atropa belladonna*

Воспаления миндалин, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов, сопровождающиеся повышением температуры.

*Sticta*

Острые воспалительные состояния дыхательных путей.

*Tartarus stibiatus*

Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей с недостаточностью кровообращения.

*Kreosotum*

Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; возрастные заболевания.

*Ipecacuanha*

Бронхит, бронхиальная астма, коклюш, кровотечения из слизистых оболочек.

*Lobelia inflata*

Вегетативные расстройства (например, головокружение, тошнота, рвота, одышка, бронхоспазмы, раздражающий кашель, икота). Коклюш. Бронхиальная астма.

*Hyoscyamus niger*

Беспокойство и раздражительность. Расстройства сна. Спастические состояния органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

*Bryonia cretica*

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, включая плевриты с раздражающим кашлем.

**Валерианакель®**  
**Valerianaheel®**

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.

**Состав:**

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:*

*Valeriana officinalis* Ø 65 г, *Humulus lupulus* Ø 5 г, *Crataegus* Ø 5 г, *Hypericum perforatum* D1 5 г, *Melissa officinalis* Ø 3 г, *Chamomilla recutita* Ø 2 г, *Avena sativa* Ø 2 г, *Acidum picricum* D5 10 г, *Kalium bromatum* D1 1 г, *Ammonium bromatum* D1 1 г, *Natrium bromatum* D1 1 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 60% (объемных).

**Показания к применению:**

В качестве седативного средства при неврозах, неврастении, нарушениях сна, состояниях повышенной нервной возбудимости.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 2 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь: взрослым и подросткам по 15 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день (вечером можно применять по 20 капель), за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи; детям от 6 до 12 лет – 10 капель 3 раза в день, детям от 2 до 6 лет – по 5 капель 3 раза в день. Курс лечения – 3–4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Препарат содержит этиловый спирт около 60% (объемных). При применении в рекомендуемых дозах Валерианакель не оказывает влияния на безопасность при управлении транспортом и работе с механизмами.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Valeriana officinalis*

Бессонница, беспокойство, нервные расстройства.

*Humulus lupulus*

Нервозность, бессонница.

*Crataegus*

Сердечно-сосудистые болезни: слабость сердечной мышцы, сенильное сердце, расстройства сердечного ритма, стенокардия и нарушения артериального давления.

*Hypericum perforatum*

Заболевания периферической и центральной нервной системы.

*Melissa officinalis*

Регулятивные расстройства; успокоительное средство.

*Chamomilla recutita*

Воспаления дыхательных путей; боли при прорезывании зубов; воспаления и судороги пищеварительного тракта; сильные боли; депрессии. Резкие боли; состояния возбуждения.

*Avena sativa*

Состояния истощения. Расстройства сна.

*Acidum picrinicum*

Психическое истощение; обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз).

*Kalium bromatum*

Состояния возбуждения центральной нервной системы; ночные кошмары; лунатизм и бессонница; потеря памяти.

*Ammonium bromatum*

Воспаления дыхательных путей, невралгические головные боли.

*Natrium bromatum*

Нервные расстройства, повышенная возбудимость.

## Вертигохель® Vertigoheel

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.  
Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.

**Состав:**

Капли: (на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Anamirta cocculus D4 70 г, Petroleum D8 10 г, Ambra grisea D6 10 г, Conium maculatum D3 30 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

Таблетки: (на 1 таблетку): *Активные компоненты:* Anamirta cocculus D4 210 мг, Conium maculatum D3 30 мг, Ambra grisea D6 30 мг, Petroleum D8 30 мг. *Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

**Показания к применению:**

Головокружения различного происхождения, в т.ч. головокружения, связанные с укачиванием в транспорте.

**Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации.

Капли: не применять в случае заболевания алкоголизмом. Вертигохель должен применяться только после консультации с врачом в тех случаях, когда существует заболевание печени, поскольку капли содержат этиловый спирт. Поскольку не существует достаточного количества документально подтвержденных данных по применению в педиатрии, а также в силу содержания в составе капель этилового спирта, не применять для детей в возрасте до 12 лет.

Таблетки: поскольку не существует достаточно подтвержденных документально данных по применению у детей до 4 лет, не следует применять для детей до этого возраста.

### **Меры предосторожности при использовании и дополнительные указания**

Капли: Препарат содержит этиловый спирт 35% (объемных), поэтому применять с осторожностью при управлении транспортным средством, станками и т.д., а также при участии в монтажных и альпинистских работах.

### **Применение при беременности и лактации:**

В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

### **Способ применения и дозы:**

Капли: по 10 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. При острых внезапных приступах головокружений и тошноте сначала по 10 капель каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2–3 недели. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом по 10 капель каждые 15 минут за 1 час до поездки и во время поездки.

Таблетки: по 1 таблетке рассасывать под языком 3 раза в день. При острых внезапных приступах головокружений и тошноте сначала по 1 таблетке каждые 15 мин. (не более 2 часов). Курс терапии 2–3 недели.

Для профилактики и лечения головокружений при использовании транспортом по 1 таблетке каждые 15 мин. за 1 час до поездки и во время поездки. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

### **Побочное действие:**

Не выявлены.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При приеме других лекарственных средств следует посоветоваться с лечащим врачом.

### **Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу или провизору.

### **Ингредиенты и показания к ним:**

*Anamirta cocculus*

Головокружения различного происхождения; болезни движения, тошнота; обывествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); нервные расстройства и депрессии, особенно при недосыпании.

*Conium maculatum*

Кальциноз церебральных сосудов (церебросклероз с головокружениями гипоксического генеза). Параличи. Обывествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); депрессии.

*Ambra grisea*

Повышенная нервная возбудимость, нервное истощение; расстройства вегетативной нервной системы; депрессии; обызвествление сосудов головного мозга, преждевременное старение.

*Petroleum*

Воспалительные заболевания органов пищеварения; головокружения.

## Вибуркол® Viburcol

Суппозитории ректальные  
гомеопатические, 12 шт.

**Состав:**

(на 1 суппозиторий): *Активные компоненты:* Chamomilla recutita D1 1,1 мг, Atropa belladonna D2 1,1 мг, Solanum dulcamara D4 1,1 мг, Plantago major D3 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 мг. *Вспомогательные компоненты:* твердый жир.

**Показания к применению:**

В составе комплексной терапии (как жаропонижающее и противовоспалительное средство) при лечении респираторных заболеваний у детей, а также для снятия клинических проявлений при прорезывании молочных зубов.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Ректально. Для детей до 6-месячного возраста максимальная суточная доза – 2 суппозитория. Для детей от 6-месячного возраста максимальная суточная доза – 4 суппозитория (при температуре от 37,5°C), 6 суппозитория (при температуре выше 38°C). При нормализации температуры по 1 суппозиторию 1–2 раза в день еще 3–4 дня (с профилактической целью).

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не изучено.

### Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

### Ингредиенты и показания к ним:

*Chamomilla recutita*

Воспаления дыхательных путей; боли при прорезывании зубов; воспаления и судороги пищеварительного тракта; сильные боли; депрессии.

*Atropa belladonna*

Лихорадочные состояния, воспаления миндалин, дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов, мозговых оболочек, кожи и суставов.

*Solanum dulcamara*

Лихорадочные инфекции, воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов, суставов, кожи, вызванные холодом и влагой.

*Plantago major*

Головные боли; недержание мочи; поносы; кожные высыпания.

*Pulsatilla pratensis*

Воспаления дыхательных путей и склонность к простуде; воспаления и расстройства органов пищеварения; воспаления мочевого пузыря; воспаления среднего уха; корь, свинка; головные боли, бессонница, психические расстройства; нервные расстройства, депрессии.

*Calcium carbonicum Hahnemanni*

Нарушения кальциевого обмена; хронические воспаления кожи и слизистой оболочки; конституциональное средство при лимфатизме и экссудативном диатезе.

## Галиум-Хель Galium-Heel

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.

### Состав:

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Galium aparine D3 4 г, Galium mollugo D3 4 г, Sedum acre D3 5 г, Sempervivum tectorum D4 5 г, Clematis recta D4 5 г, Thuja occidentalis D3 5 г, Caltha palustris D3 5 г, Ononis spin-



osa D4 5 г, Juniperus communis D4 5 г, Hedera helix D4 5 г, Betula alba D2 5 г, Saponaria officinalis D4 5 г, Echinacea D5 5 г, Calcium fluoratum D8 5 г, Phosphorus D8 5 г, Aurum metallicum D10 5 г, Argentum metallicum D8 5 г, Apis mellifica D12 5 г, Acidum nitricum D6 5 г, Pyrogenium-Nosode D6 5 г, Urtica urens D3 2 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

**Показания к применению:**

Препарат применяется в комплексной терапии хронического бронхита, хронического синусита, бронхиальной астмы, а также нейродермита, экземы.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Препарат принимают: у взрослых – по 10 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. Курс лечения 3–4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом. Применение препарата у детей возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Galium aparine*

Камни в почках. Язвы, особенно языка (как средство ускорения регенерации и образования грануляционной ткани).

*Galium mollugo*

Средство детоксикации.

*Sedum acre*

Боли в заднем проходе (например, при геморрое, свищах).

*Sempervivum tectorum*

Узелковые уплотнения кожи, языка. Бородавки.

*Clematis recta*

Кожная сыпь. Лимфоаденопатия. Воспаления век, соединительной ткани, мочевого пузыря, уретры, яичек, грудных желез.

*Thuja occidentalis*

Заболевания кожи и слизистых оболочек; ревматизм, депрессии; склонность к пролиферативным процессам (бородавкам, полипам и т. п.), а также болезненные состояния, вызванные очаговыми интоксикациями. Желудочно-кишечные расстройства. Снижение настроения. Расстройства речи.

*Caltha palustris*

Кожная сыпь (пемфигус, пустулы).

*Ononis spinosa*

Водянка.

*Juniperus communis*

Нарушения выделительной функции почек. Диспепсия.

*Hedera helix*

Острые воспаления органов дыхания (например, риниты, синуситы), пищеварения. Гиперфункция щитовидной железы. Ревматические заболевания.

*Betula alba*

Диуретик. Холеретик. Катаральные воспаления слизистых, в особенности, желудка.

*Saponaria officinalis*

Головные боли и боли в глазных яблоках. Экзема; переохлаждения.

*Echinacea*

Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с лихорадкой (стимуляция клеточного иммунитета).

*Calcium fluoratum*

Воспалительные процессы в органах дыхания, желудочно-кишечного тракта. Дегенеративные заболевания соединительной ткани. Заболевания щитовидной железы.

*Phosphorus*

Воспалительные болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполовых органов. Тяжелые инфекционные заболевания. Нарушения развития и состояния истощения. Сердечно-сосудистая патология. Кровотечения. Ревматизм. Невралгии и цефалгии. Глазные болезни. Нарушения поведения и настроения. Кроме того, дренажное средство для паренхимы легких, сердца, печени, почек.

*Aurum metallicum*

Гнойные заболевания слизистых. Оститы и периоститы. Артериальная гипертензия. Кальциноз сосудов. Стенокардия. Уплотнения железистых органов. Депрессия.

*Argentum metallicum*

Хронические воспаления зева и гортани. Состояния нервно-психического истощения. Заболевания нервной системы с парезами и судорогами конечностей. Воспаления яичников.

*Apis mellifica*

Воспалительные и другие заболевания, сопровождающиеся отеками.

*Acidum nitricum*

Воспалительные болезни кожи и слизистых со склонностью к трещинам. Заболевания, сопровождающиеся похуданием. Патологические изменения настроения.

*Pyrogenium-Nosode*

Тяжелые инфекции с лихорадкой. Кроме того, склонность к септическим состояниям, связанным с недостаточностью иммунитета.

*Urtica urens*

Кожные болезни по типу крапивницы. Болезни почек. Подагра.

## Гастрикумель Gastricumel

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.

**Состав:**

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

Argentum nitricum D6 30 мг, Acidum arsenicosum D6 30 мг, Pulsatilla pratensis D4 60 мг,

Strychnos nux-vomica D4 60 мг, Carbo vegetabilis D6 60 мг, Stibium sulfuratum nigrum D6

60 мг. *Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

**Показания**

Воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка (гастрит) и диспептические расстройства желудочно-кишечного тракта (изжога, метеоризм).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 3-х лет.

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов (но не более 12 таблеток в день). Курс лечения – 2–3 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Argentum nitricum*

Мигрень. Хронические заболевания слизистых. Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, боли при различных воспалениях слизистых оболочек.

*Arsenicum album*

Воспалительные процессы различной тяжести и локализации. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Невротические расстройства (беспокойство, страх, отчаяние).

*Pulsatilla pratensis*

Воспалительные и другие нарушения органов пищеварения (особенно слизистых). Расстройства сна, психические и невротические расстройства. Патологические изменения настроения.

*Strychnos nux-vomica*

Воспаления и спастические состояния органов желудочно-кишечного тракта. Патология гепатобилиарной системы. Истощение. Расстройства пищеварения. Расстройства сна. Нервозность и раздражительность. Меланхолия.

*Carbo vegetabilis*

Расстройства функций органов пищеварения, метеоризм. Кровоточивость слизистых.

*Stibium sulfuratum nigrum*

Расстройства пищеварения (диспепсия, отсутствие аппетита с отвращением к пище, чувство переполнения).

## Гепар композитум® Hepar compositum®

Раствор для внутримышечного  
и подкожного введения  
гомеопатический,  
ампулы по 2,2 мл.



### Состав:

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Hepar suis D8 22 мкл, Суанособаламинум D4 22 мкл, Duodenum suis D10 22 мкл, Thymus suis D10 22 мкл, Colon suis D10 22 мкл, Vesica felleae suis D10 22 мкл, Pankreas suis D10 22 мкл, China D4 22 мкл, Lycopodium clavatum D4 22 мкл, Chelidonium majus D4 22 мкл, Silybum marianum D3 22 мкл, Histaminum D10 22 мкл, Sulfur D13 22 мкл, Avena sativa D6 22 мкл, Fel tauri D8 22 мкл, Natrium oxalaceticum D10 22 мкл, Acidum  $\alpha$ -ketoglutaricum D10 22 мкл, Acidum malicum D10 22 мкл, Acidum fumaricum D10 22 мкл, Acidum alpha-liponicum D8 22 мкл, Acidum oroticum D6 22 мкл, Cholesterinum D10 22 мкл, Calcium carbonicum Hahnemanni D28 22 мкл, Taraxacum officinale D4 22 мкл, Сунара scolymus D6 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

### Показания к применению:

Острые и хронические заболевания печени и желчного пузыря. В комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).

### Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### Применение при беременности и лактации:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

1–3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно.

Курс терапии при острых заболеваниях 3–5 недель; при хронических заболеваниях не менее 4–8 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

### Побочное действие:

В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию этим препаратом следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Cyanocobalaminum*

Поражения паренхимы печени. Нарушения детоксикационной функции печени. Нарушения жирового и углеводного обмена.

*Hepar suis*

Стимуляция детоксикационной функции печени. Хронические кожные болезни: нейродермит, псориаз, эритемы.

*Duodenum suis*

Дуоденит. Язва 12-перстной кишки. Гастрокардиальный синдром.

*Thymus suis*

Стимуляция функций лимфатической системы. Нарушения развития и роста.

*Colon suis*

Стимуляция функций дезинтоксикации. Атония кишечника. Тенезмы. Колит, в том числе язвенный.

*Vesica felleae suis*

Хронический холангит и холецистит.

*Pankreas suis*

Панкреопатии. Хронический энтерит. Гастрокардиальный синдром. Кахексия. Ма-разм.

*China*

Анемия. Общее истощение. Невралгии. Острый понос. Расстройства пищеварения. Желчная колика. Кожная сыпь.

*Lycopodium clavatum*

Воспалительные и другие болезни гепатобилиарной системы. Расстройства пищеварения. Различные хронические и острые кожные болезни. Возрастные болезни. Патологические изменения поведения и настроения.

*Chelidonium majus*

Воспалительные и другие хронические заболевания гепатобилиарной системы. Желчнокаменная болезнь.

*Silybum marianum*

Заболевания гепатобилиарной системы (в особенности застойные явления в системе воротной вены и венах малого таза); геморрой.

*Histaminum*

Аллергические заболевания кожи и слизистых. Низкое артериальное давление.

*Sulfur*

Различные, особенно хронические кожные болезни, экзема с зудом и гнойничковыми поражениями кожи. Острые и хронические воспаления дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей. Расстройства функций гепатобилиарной системы. Варикоз, геморрой, кровотечения. Сердечно-сосудистые болезни, нарушения артериального давления. Ревматические болезни. Расстройство сна и невротические расстройства. Состояния слабости. Патологические изменения поведения и настроения. Кроме того, конституциональное, "реакционное" средство, стимулирующее иммунитет.

*Avena sativa*

Состояния истощения. Расстройства сна.

*Fel tauri*

Нарушения функций гепатобилиарной системы.

*Natrium oxalaceticum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Особенно показан при гипертонии и стенокардии. Непереносимость жиров и белков. Гепатит. Язва желудка, 12-перстной кишки (гепатогенная язва). Холецистит с коликами, состояние после холецистэктомии, аллергическая и мокнущая экзема.

*Acidum  $\alpha$ -ketoglutaricum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Состояния разбитости. Болезненное увеличение печени, чувство переполнения после еды. Чешуйчатая экзема.

*Acidum fumaricum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Состояния истощения. Холелитиаз. Себорея. Угри.

*Acidum malicum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Уплотнения печени. Холелитиаз. Заболевания кожи с зудом.

*Acidum alpha-liponicum*

Коэнзим, участвующий в процессах метаболизма пировиноградной кислоты (окислительное декарбоксилирование).

*Acidum oroticum*

Заболевания печени.

*Cholesterinum*

Заболевания печени. Гиперхолестеринемия.

*Calcium carbonicum Hahnemanni*

Хронические заболевания кожи и слизистых.

*Taraxacum officinale*

Воспалительные и другие заболевания гепатобилиарной системы.

*Cynara scolymus*

Хронические заболевания гепатобилиарной системы.

*Veratrum album*

Нарастающая недостаточность кровообращения при инфекционных заболеваниях. Поносы. Невралгии. Невротические расстройства с преобладанием возбудимости.

## Гинекохель® Gynaschoeel

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.



**Состав:**

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Apis mellifica D4 10 г, Ammonium bromatum D4 10 г, Lilium lancifolium D4 10 г, Aurum jodatatum D12 10 г, Crabro vespa D4 10 г, Helonias dioica D4 10 г, Palladium metallicum D12 10 г, Platinum metallicum D12 10 г, Naja naja D12 10 г, Melilotus officinalis D3 5 г, Viburnum opulus D2 5 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемные).

**Показания к применению:**

В комплексной терапии воспалительных заболеваний женских половых органов (аднексит, сальпингит, кольпит).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. В случае заболевания щитовидной железы этот препарат не может быть назначен без предварительной консультации с врачом.

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

По 10 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. Курс терапии – 2–3 недели под контролем врача. При обострениях по 10 капель каждые 15 мин (в течение 2 часов). При недостаточной эффективности необходимо обратиться к врачу.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Apis mellifica*

Воспалительные и другие заболевания с накоплением жидкости в тканях и полостях организма.

*Ammonium bromatum*

Воспаления дыхательных путей, невралгические головные боли; заболевания слизистых; катары на нервной почве.

*Lilium lancifolium*

Опущения матки. Воспалительные заболевания женских гениталий. Раздражительность.

*Aurum iodatum*

Повышенное артериальное давление. Кальциноз и другие заболевания артерий. Уплотнения железистых органов. Кроме того, метрит, миома матки.

*Crabro vespa*

Отечность слизистых оболочек. Воспаления мочеполовых органов.

*Chamaelirium luteum*

Опущение матки. Состояния истощения. Патологические нарушения настроения.

*Palladium metallicum*

Заболевания яичников. Опущение матки. Патологические изменения настроения.

*Platinum metallicum*

Невралгии, цефалгии. Заболевания и другие нарушения женских половых органов. Раздражительность.

*Naja naja*

Нарушения сердечной деятельности. Патологические изменения настроения. Кроме того, овариалгии.

*Melilotus officinalis*

Цефалгии. Варикоз. Кроме того, явления застоя в малом тазу с дисменореей.

*Viburnum opulus*

Болезненные менструации.

## Гирель Gireel

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.



### Состав:

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

Aconitum D4 120 мг; Bryonia D4 60 мг;  
Lachesis mutus D12 60 мг; Eupatorium per-  
foliatum D3 30 мг; Phosphorus D5 30 мг.

*Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

### Показания к применению:

Препарат применяют для облегчения симптомов при гриппозных состояниях (головная боль, повышение температуры, потеря аппетита, слабость и т.д.).

### Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### Применение при беременности и лактации:

Как и прочие лекарственные средства, гомеопатические препараты должны применяться в период беременности и кормления грудью только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Если не прописано иначе, по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком, при острых случаях каждые 15 мин. по 1 таблетке в течение 2 часов. Если в течение 6 часов не происходит улучшение состояния больного, необходимо обратиться к врачу.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. Если это случилось, необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания:

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу или фармацевту.

### Ингредиенты и показания к ним:

*Aconitum*

Острые воспалительные заболевания; нервные заболевания. Неврологические

заболевания в сочетании с болевым синдромом. Острые расстройства сердечной деятельности с приступами страха.

#### *Bryonia*

Острые воспаления органов дыхания, плевры, брюшины, печени. Ревматизм.

#### *Lachesis mutus*

Воспаления и кровотечения кожи и слизистых. Инфекционные болезни. Сердечно-сосудистая недостаточность. Невралгии. Патологические изменения настроения и поведения.

#### *Eupatorium perfoliatum*

Грипп, гриппозные инфекции с лихорадкой. Заболевания желчевыводящей системы с лихорадкой. Ревматизм.

#### *Phosphorus*

Воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; тяжелые инфекции, медленное выздоровление, состояния истощения; заболевания глаз, резкая смена настроений, депрессии.

## Гормель СН Hormeel® SN

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.

### Состав:

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:* *Sepia officinalis* D6 5 г, *Calcium carbonicum Hahnemanni* D8 10 г, *Acidum nitricum* D4 5 г, *Conyza canadensis* D3 5 г, *Viburnum opulus* D3 5 г, *Pulsatilla pratensis* D4 5 г, *Cyclamen purpurascens* D4 5 г, *Strychnos ignatii* D6 5 г, *Aquilegia vulgaris* D4 10 г, *Origanum majorana* D4 10 г, *Myristica fragrans* D6 10 г.

*Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

### Показания к применению:

Препарат применяется в комплексной терапии при дисменореях.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.



**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. Длительность терапии определяется врачом. Средний курс лечения составляет 1–3 месяца. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

В составе препарата содержится около 35% (объемных) этилового спирта. Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,43 г этилового спирта.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Acidum nitricum*

Мигрень. Кроме того, хронические заболевания слизистых. Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени, типичные боли при различных воспалениях слизистых оболочек.

*Conyza canadensis*

Маточные кровотечения (менорагии, метрорагии).

*Viburnum opulus*

Болезненные менструальные кровотечения.

*Pulsatilla pratensis*

Воспаления и нарушения в женских половых органах, воспаления влагалища, сопровождающиеся выделениями; различные регулятивные расстройства; расстройства в период беременности и при кормлении грудью; головные боли, нарушения сна, психические нарушения; нервные расстройства.

*Sepia officinalis*

Различные нарушения в женских половых органах, головные боли, бессонница; состояния истощения, психические расстройства и депрессии; климактерические расстройства.

*Cyclamen purpurascens*

Головные боли, регуляторные нарушения, депрессии.

*Strychnos ignatii*

Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.

*Calcium carbonicum Hahnemanni*

Нарушения кальциевого обмена; хронические заболевания слизистой оболочки; пролиферативные процессы слизистой оболочки.

*Aquilegia vulgaris*

Бессонница, нервозность; дисменорея, функциональная аменорея.

*Origanum majorana*

Повышенная сексуальная возбудимость (нервная возбудимость).

*Myristica fragrans*

Психосоматические симптомы. Слабость пищеварения в сочетании с метеоризмом. Нарушения восприятия (депрессии).

## Дискус композитум Discus compositum

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.

**Состав:**

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:*

Discus intervertebralis suis D8 22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 22 мкл, Cartilago suis D8 22 мкл, Medulla ossis suis D10 22 мкл, Embryo totalis suis D10 22 мкл, Suprarenalis glandula suis D10 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Hydrargyrum oxudatum rubrum D10 22 мкл, Sulfur D28 22 мкл, Cimicifuga racemosa D4 22 мкл, Ledum palustre D4 22 мкл, Pseudognaphalium obtusifolium D3 22 мкл, Citrullus colocynthis D4 22 мкл, Secale cornutum D6 22 мкл, Argentum metallicum D10 22 мкл, Zincum metallicum D10 22 мкл, Cuprum aceticum D6 22 мкл, Aesculus hippocastanum D6 22 мкл, Medorrhinum D18 22 мкл, Ranunculus bulbosus D4 22 мкл, Ammonium chloratum D8 22 мкл, Cinchona pubescens D4 22 мкл, Kalium carbonicum D6 22 мкл, Sepia officinalis D10 22 мкл, Acidum picricum D6 22 мкл, Berberis vulgaris D4 22 мкл, Acidum silicicum D6 22 мкл, Calcium phosphoricum D10 22 мкл, Acidum DL-alpha-liponicum D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 мкл, Nadidum D6 22 мкл, Coenzym A D10 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.

**Показания к применению:**

Препарат применяется при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Acidum ascorbicum*

Кофермент (регуляция окислительно-восстановительных процессов).

*Thiaminum hydrochloricum*

Кофермент (окислительное декарбоксилирование).

*Natrium riboflavinum phosphoricum*

Кофермент (флавопротеиды и окислительно-восстановительные процессы).

*Pyridoxinum hydrochloricum*

Кофермент (трансаминазы, дегидратазы, десульфгидразы, декарбоксилазы).

*Nicotinamidum*

Кофермент (дегидратазы).

*Discus intervertebralis suis*

Остеохондроз. Ревматические болезни, вертеброгенные невралгии.

*Funiculus umbilicalis suis*

Болезни соединительной ткани. Остеохондроз. Коксартроз. Вертеброгенные невралгии. Шейный синдром.

*Cartilago suis*

Заболевания суставов.

*Medulla ossis suis*

Деформирующий артроз, особенно тазобедренного сустава. Остеомаляция. Хронический остеомиелит. Экзостозы.

*Embryo totalis suis*

Стимуляция процессов регенерации. Атеросклероз. Стимуляция кровообращения.

*Suprarenalis glandula suis*

Первичный хронический полиартрит. Ваготония. Состояния истощения.

*Pulsatilla pratensis*

Ревматические болезни. Цефалгии. Невротические и психические расстройства, расстройства сна.

*Hydrargyrum oxydatum rubrum*

Гнойничковые болезни кожи и слизистых. Кроме того, ночные боли в костях. Периоститы.

*Sulfur*

Ревматические болезни, невротические расстройства. Состояния слабости. Нарушения настроения.

*Cimicifuga racemosa*

Миалгии ревматоидного и вертеброгенного генеза. Боли спастического характера в области сердца. Маниакальные и депрессивные состояния.

*Ledum palustre*

Подагра. Суставной ревматизм.

*Pseudognaphalium obtusifolium*

Ревматизм. Ишиалгия. Невралгии.

*Citrullus colocynthis*

Невриты и невралгии, особенно в области лица. Ишиалгия.

*Secale cornutum*

Судороги мышц. Парезы. Заболевания артерий. Кроме того, парестезии.

*Argentum metallicum*

Болезни нервной системы с парезами, судорогами в конечностях.

*Zincum metallicum*

Судороги и невралгии. Заболевания позвоночного столба и спинного мозга. Состояния истощения. Расстройства сна.

*Cuprum aceticum*

Судорожные синдромы или склонность к судорогам мышц. Судороги икроножных мышц. Стенокардия.

*Aesculus hippocastanum*

Расстройства венозного кровообращения. Боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

*Medorrhinum*

Ревматизм. Нарушения поведения. Преждевременное старение. Кроме того, заболевания суставов, включая межпозвоночные.

*Ranunculus bulbosus*

Ревматические болезни грудного отдела позвоночника и грудной клетки. Невралгии (особенно межреберные).

*Ammonium chloratum*

Ишиалгия. Невралгии.

*Cinchona pubescens*

Общее истощение. Невралгии.

*Kalium carbonicum*

Болезни износа опорно-двигательного аппарата. Общая слабость.

*Sepia officinalis*

Ревматические болезни. Варикоз. Цефалгии. Расстройства сна. Состояния истощения. Депрессия.

*Acidum picricum*

Состояния нервного истощения (в сочетании с болями в спине, крестце, суставах и мышцах).

*Berberis vulgaris*

Болезни печени и желчного пузыря. Кроме того, ревматические и обменные поражения суставов. Ухудшение состояния при движениях.

*Acidum silicicum*

Хронические воспаления суставов и костей. Слабость соединительной ткани, связочного аппарата, костей и суставов. Кроме того, типичное ухудшение состояния при охлаждении.

*Calcium phosphoricum*

Состояния истощения. Дефицит кальция в организме. Заболевания позвоночника.

*Acidum DL-alpha-liponicum*

Коэнзим, участвующий в реакциях распада пировиноградной кислоты.

*Natrium diethyloxalaceticum*

Кофермент цикла трикарбоновых кислот и окислительно-восстановительных процессов.

*Nadidum*

Биокатализатор. Стимулятор окисления в цепи дыхательных ферментов.

*Coenzym A*

Коэнзим для трансацетилирования.

## Дуоденохель® Duodenoheel®

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.



### Состав:

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

*Semecarpus anacardium D4 30 мг, Argentum*

*nitricum D6 30 мг, Ipescacuanha D4 30 мг,*

*Jodum D6 30 мг, Lachesis mutus D12 60 мг, Petroleum rectificatum D6 60 мг,*

*Robinia pseudoacacia D4 60 мг. Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

### Показания:

Препарат применяют в комплексной терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, гастродуодените, гастрите с повышенной кислотностью.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к йоду, заболевания щитовидной железы, беременность, период лактации, детский возраст до 4-х лет.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

### Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс лечения – 3–4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

Применение препарата у детей от 4-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать

прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Semecarpus anacardium*

Расстройства пищеварения. Расстройства настроения. Атония кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, нервное истощение, депрессии, навязчивые идеи.

*Argentum nitricum*

Заболевания желудочно-кишечного тракта.

*Ipecacuanha*

Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Кровотечения из слизистых.

*Jodum*

Гиперфункция щитовидной железы. Примечание: характерно похудание, несмотря на повышенный аппетит, а также дуоденит без язвы или с язвой (голодные боли, проходящие после приема пищи).

*Lachesis mutus*

Воспаления и кровоточивость слизистых.

Нарушения настроения и поведения.

*Petroleum rectificatum*

Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

*Robinia pseudoacacia*

Повышенная кислотность желудочного сока. Диарея.

## Калькохель Calcoheel®

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.



**Состав:**

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*  
Calcium carbonicum Hahnemanni D8 180 мг,  
Solanum dulcamara D6 30 мг, Chamomilla  
recutita D4 30 мг, Carbo vegetabilis D12 60 мг.

*Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

**Показания к применению:**

В комплексной терапии нарушений кальциевого обмена в организме.

**Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и лактации:**

В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

**Способ применения и дозы:**

По 1 таблетке 3 раза в день обычно рассасывать под языком. Длительность курса лечения согласовывается с врачом.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими препаратами:**

Не описано.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу или фармацевту.

**Ингредиенты и показания к ним:***Calcium carbonicum Hahnemanni*

Нарушения кальциевого обмена; хронические воспаления кожи и слизистых оболочек; конституциональное средство при лимфатизме и экссудативном диатезе.

*Solanum dulcamara*

Лихорадочный синдром. Воспалительные заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, суставов, кожи вследствие переохлаждения в условиях повышенной влажности.

*Chamomilla recutita*

Воспалительные процессы дыхательных путей. Болезни зубов (прорезывание зубов). Сильные боли вследствие чрезмерной чувствительности нервной системы. Повышенная раздражительность, беспокойство.

*Carbo vegetabilis*

Расстройства пищеварительных органов в сочетании с метеоризмом.

## Климакт-Хель Klimakt-Heel

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.



### Состав:

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:* Sanguinaria canadensis D3 30 мг, Sepia officinalis D4 30 мг, Sulfur D4 30 мг, Strychnos ignatii D4 30 мг, Simarouba cedron D4 30 мг, Stannum metallicum D12 60 мг, Lachesis mutus D12 90 мг.

*Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

### Показания:

В комплексной терапии вегетативных нарушений в климактерическом периоде (повышенная нервная возбудимость, приливы, головная боль и т.п.)

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. При имеющихся заболеваниях печени и/или одновременном применении токсичных для печени веществ, препарат следует принимать только после предварительной консультации с врачом.

### Применение при беременности и лактации:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин. до еды или спустя 1 час после приема пищи. Курс лечения – 1–2 месяца. При необходимости врач может увеличить курс терапии.

### Побочные эффекты:

Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях во время лечения препаратами, содержащими сангвинарию, может наблюдаться повышение уровня показателей функциональной активности печени (трансаминаз) и уровня билирубина вплоть до обусловленной лекарственными средствами желтухи (медикаментозно-токсический гепатит); прекращение приема препарата приводит к нормализации этих показателей.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом слу-

чае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

#### **Ингредиенты и показания к ним:**

*Sanguinaria canadensis*

Мигрени, климактерические жалобы.

*Sepia officinalis*

Различные заболевания женских половых органов, головные боли, бессонница, состояния истощения, психические нарушения и депрессии.

*Sulfur*

Воспаления мочевыводящих и половых органов, расстройства сердечно-сосудистой деятельности, нарушения кровяного давления, ревматические заболевания, бессонница, нервные расстройства, слабость, депрессии.

*Strychnos ignatii*

Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.

*Simarouba cedron*

Невралгии.

*Stannum metallicum*

Невралгии, колики, истощение, депрессии.

*Lachesis mutus*

Климактерические жалобы, грудная жаба, ослабления сердечно-сосудистой деятельности, невралгии, психические расстройства и депрессии.

## **Коэнзим композитум Coenzyme compositum**

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.



#### **Состав:**

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компонен-*

*ты:* Coenzym A D8 22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Acidum cis-aconiticum D8 22 мкл, Acidum citricum D8 22 мкл, Acidum fumaricum D8 22 мкл, Acidum alpha-ketoglutaricum D8 22 мкл, Acidum malicum D8 22 мкл, Acidum succinicum D8 22 мкл, Barium oxalsuccinicum D10 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 мкл, Natrium pyruvicum D8 22 мкл, Cysteine D6 22 мкл,

Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Hepar sulfuris D10 22 мкл, Sulfur D10 22 мкл, Adenosintri-phosphat-dinatrium D10 22 мкл, Nadidum D8 22 мкл, Manganum phosphoricum D6 22 мкл, Magnesium oroticum dihydricum D6 22 мкл, Cerium oxalicum D8 22 мкл, Acidum DL-alpha-liponicum D6 22 мкл, Beta vulgaris conditiva D4 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

**Показания к применению:**

Препарат применяется в комплексной терапии нарушений окислительно-восстановительных процессов в организме при гиповитаминозах, повышенных физических и умственных нагрузках, хронических заболеваниях суставов и позвоночника, органов дыхания, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Acidum ascorbicum*

Кофермент (регуляция окислительно-восстановительных процессов).

*Thiaminum hydrochloricum*

Кофермент (окислительное декарбоксилирование).

*Natrium riboflavinum phosphoricum*

Кофермент (флавопротеиды и окислительно-восстановительные процессы).

*Pyridoxinum hydrochloricum*

Кофермент (трансаминазы, дегидратазы, десульфгидразы, декарбоксилазы).

*Nicotinamidum*

Кофермент (дегидратазы).

*Acidum cis-aconicum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.

*Acidum citricum*

Регулятор цикла Кребса. Кровоточивость десен. Истощение. Преждевременное старение, атеросклероз, в особенности церебросклероз.

*Acidum fumaricum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Состояния истощения.

*Acidum alpha-ketoglutaricum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Состояние разбитости.

*Acidum malicum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Регулятор процессов дезинтоксикации.

*Acidum succinicum*

Регулятор цикла Кребса. Сенной насморк. Состояние истощения.

*Barium oxalsuccinicum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Эндокринные расстройства, нарушения кровообращения в конечностях.

*Natrium oxalaceticum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Снижение защитных механизмов.

*Natrium pyruvicum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Регулятор процессов дезинтоксикации.

*Cysteine*

Сульфгидрильный фактор окислительно-восстановительного потенциала. Ретоксические нарушения.

*Pulsatilla pratensis*

Кожные болезни. Варикоз. Воспалительные заболевания дыхательных путей; склонность к простудным заболеваниям. Заболевания органов пищеварения, женских половых органов, мочевого пузыря. Ревматические болезни. Расстройства сна, нервно-психические расстройства.

*Hepar sulfuris*

Воспалительные и гнойничковые заболевания кожи и слизистых оболочек. Предрасположенность к расстройствам лимфатической системы. Нервозность.

### *Sulfur*

Различные, особенно хронические кожные болезни. Острые и хронические заболевания дыхательных и мочеполовых путей, желудочно-кишечного тракта. Заболевания сердечно-сосудистой системы, включая нарушения артериального давления. Ревматические болезни. Расстройства сна. Нервные расстройства. Состояния слабости. Нарушения настроения. Кроме того, конституциональное, реакционное, а также повышающее клеточный иммунитет средство.

### *Adenosinriphosphat-Dinatrium*

Поддержание энергетики клеток (цикл Кребса и др.), особенно при терапии иатрогенных заболеваний.

### *Nadidum*

Биокатализатор. Стимулятор окислительных процессов.

### *Manganum phosphoricum*

Состояния истощения с анемией. Восполнение потребности организма в микроэлементах.

### *Magnesium oroticum dihydricum*

Восполнение потребности организма в микроэлементах, особенно для улучшения функций печени.

### *Cerium oxalicum*

Рвота. Судорожный кашель. Состояния, связанные с гипоксией.

### *Coenzym A*

Коэнзим для процессов трансацетилирования.

### *Acidum DL-alpha-liponicum*

Кофермент для процессов гидроксирования, необходимый при распаде пировиноградной кислоты (окислительное декарбоксилирование)

### *Beta vulgaris conditiva*

Реактивация тканевого дыхания (в том числе, при инфекционных заболеваниях). Хронические катары.

## **Кралонин®** **Cralonin**

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.

### **Состав:**

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:*  
*Crataegus* Ø 70 мл, *Spigelia anthelmia* D2 1 мл,



Kalium carbonicum D3 1 мл. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 45% (объемных).

**Показания к применению:**

Применяется при ишемической болезни сердца, особенно в старческом возрасте. Указание: при болях в области груди, отдающих в руку, эпигастральную область или в шею, при удушье, а также в том случае, если жалобы сопровождаются состояниями тревоги, рвотой или приступами потоотделения, и улучшение не наступает в течение получаса, необходимо вызвать неотложную помощь.

**Противопоказания:**

Поскольку не существует достаточно подтвержденных данных по применению в педиатрии, не следует применять для детей в возрасте до 12 лет.

Применение лекарственного средства при сердечной недостаточности возможно только после консультации с врачом.

**Применение при беременности и лактации:**

В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

**Способ применения и дозы:**

По 10–20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. Коррекцию дозы проводит врач. Курс лечения 2–3 недели.

При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Гомеопатические препараты не должны применяться в течение длительного времени без консультации с врачом.

**Побочное действие:**

В отдельных случаях могут наблюдаться временное покраснение кожи лица, тахикардия и увеличение частоты пульса, отек, а также головокружение и легкие болевые ощущения в области желудка.

Указание: при приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, о которых не указано в инструкции, следует сообщить об этом врачу или фармацевту.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Crataegus*

Сердечно-сосудистые заболевания: болезни миокарда, "сенильное сердце", расстройства сердечного ритма, стенокардия и нарушения артериального давления.

### *Spigelia anthelmia*

Острые воспалительные заболевания миокарда и эндокарда. Стенокардия. Невралгии.

### *Kalium carbonicum*

Болезни сердца. Нарушения водно-солевого обмена. Отечный синдром. Болезни износа опорно-двигательного аппарата (вертеброгенная стенокардия). Общая слабость.

## Кутис композитум *Cutis compositum*

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.



### **Состав:**

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Cutis suis D8, Hepar suis D10, Splen suis D10, Placenta suis D10, Glandula suprarenalis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Thuja occidentalis D8, Galium aparine D6, Selenium D10, Thallium sulfuricum D13, Strychnos ignatii D6, Sulfur D10, Cortisonum aceticum D28, Urtica urens D4, Acidum phosphoricum D6, Calcium fluoratum D13, Mercurius solubilis Hahnemanni D13, Aesculus hippocastanum D6, Ichthyolum D28, Sanguinarinum nitricum D6, Ledum palustre D4, Arctium lappa D6, Acidum formicicum D198, Pyrogenium-Nosode D198, Acidum alpha-ketoglutaricum D10, Acidum fumaricum D10, Natrium diethyloxalaceticum D10 по 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

### **Показания к применению:**

Препарат применяется в дерматологии для лечения угревой сыпи (акне) умеренно выраженной и средней степени тяжести.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, особенно к ихтиолу.

### **Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### **Способ применения и дозы:**

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения – 4 недели.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях препарат следует отменить.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:***Cutis suis*

Стимуляция функций кожи. Дерматозы. Себорея. Экзема. Трещины кожи. Пролежни. Кожные проявления аллергической (нейродермит) и другой природы (например, ожоги, состояния после лучевой терапии).

*Hepar suis*

Стимуляция детоксикационных функций печени.

*Splen suis*

Стимуляция функций селезенки.

*Placenta suis*

Расстройства периферического кровообращения. Пролежни. Язвы голени. Экземы.

*Glandula suprarenalis suis*

Нейродермит. Трещины кожи. Ожоги.

*Funiculus umbilicalis suis*

Стимуляция функций соединительной ткани. Расстройства кровообращения. Дерматиты. Нейродермит.

*Thuja occidentalis*

Болезни кожи и слизистых (особенно со склонностью к пролиферации: бородавки, папилломы, невусы).

*Galium aparine*

Язвы, гнойники (особенно языка). Новообразования.

*Selenium*

Кожная сыпь. Жирная кожа. Расстройства пищеварения.

*Thallium sulfuricum*

Выпадение волос.

*Strychnos ignatii*

Невротические расстройства. Плохое настроение. Повышенная чувствительность кожи.

### *Sulfur*

Различные, особенно хронические заболевания кожи, зудящая экзема и гнойничковые болезни. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Нарушения функций печени. Невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и восприятия. Кроме того, конституциональное средство, стимулирующее иммунитет.

### *Cortisonum aceticum*

Нарушения функций надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани.

### *Urtica urens*

Крапивница и другие аллергические заболевания.

### *Acidum phosphoricum*

Состояния физического и психического истощения. Нарушения кальциевого обмена.

### *Calcium fluoratum*

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Дегенеративные процессы соединительной ткани. Болезни щитовидной железы.

### *Mercurius solubilis Hahnemanni*

Кожные болезни. Воспалительные заболевания лимфатических желез.

### *Aesculus hippocastanum*

Венозный застой. Геморрой.

### *Ichtyolum*

Гнойничковые болезни кожи.

### *Sanguinarinum nitricum*

Воспаления органов дыхания. Угри.

### *Ledum palustre*

Травматические повреждения тканей. Кровотечения из слизистых оболочек и кожи.

### *Arctium lappa*

Высыпания с обильным отделяемым.

### *Acidum formicicum*

Экзема. Аллергии.

### *Pyrogenium-Nosode*

Инфекции с тяжелым течением. Кроме того, пролежни, инфицированные раны.

### *Acidum alpha-ketoglutaricum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Дерматозы. Незаживающие гнойные раны. Чешуйчатая экзема. Микозы. Восприимчивая к болезням кожа.

### *Acidum fumaricum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Дерматозы. Угри. Пищевая аллергия. Экзема. Себорея.

*Natrium diethyloxalaceticum*

Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Дерматозы. Гипергидроз.

## Лептандра композитум *Leptandra compositum*

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.

**Состав:**

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:* *Veronica virginica* D2 1 г, *Quassia amara* D3 1 г, *Podophyllum peltatum* D3 1 г, *Acidum arsenicosum* D4 1 г, *Carbo vegetabilis* D10 1 г, *Niccolum metallicum* D10 1 г, *Phosphorus* D6 1 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

**Показания к применению:**

В комплексной терапии диспептических расстройств (изжога, тошнота, метеоризм, боли в эпигастральной области), обусловленных заболеваниями печени и желчного пузыря.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать по 10 капель каждый час или каждые полчаса, но не более 12 раз в день. Длительность терапии определяется врачом.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать



прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить врачу.

При желтухе, устойчивых, неясных или возобновляющихся симптомах следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Veronica virginica (Leptandra)*

Воспаления печени, желчевыводящих путей; диарея, панкреопатия.

*Quassia amara*

Заболевания печени и органов пищеварения.

*Podophyllum peltatum*

Заболевания печени и желчного пузыря; последствия операций на желчном пузыре; при сильной рвоте.

*Acidum arsenicosum*

Воспаления в различных органах и тканях, доброкачественные и злокачественные опухоли, тяжелые инфекции, депрессии.

*Carbo vegetabilis*

Расстройства органов пищеварения в сочетании с метеоризмом.

*Niccolum metallicum*

Головные боли, депрессии, панкреопатии.

*Phosphorus*

Воспалительные заболевания органов пищеварения (прежде всего, печени и поджелудочной железы), тяжелые инфекционные заболевания, истощение, психические расстройства и депрессии.

## Лимфомиозот® Lymphomyosot®

Раствор для инъекций  
гомеопатический,  
ампулы по 1,1 мл.  
Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.



**Состав:**

Раствор для инъекций: (на 1 ампулу):

*Активные компоненты:* Myosotis

arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparilla D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans regia D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxinum D12, Araneus diadematus D6 по 0,55 мкл; Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum jodatum D12 по 1,1 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

Капли: (на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Myosotis arvensis D3 5 г, Veronica officinalis D3 5 г, Teucrium scorodonia D3 5 г, Pinus sylvestris D4 5 г, Gentiana lutea D5 5 г, Equisetum hyemale D4 5 г, Sarsaparilla D6 5 г, Scrophularia nodosa D3 5 г, Juglans regia D3 5 г, Calcium phosphoricum D12 5 г, Natrium sulfuricum D4 5 г, Fumaria officinalis D4 5 г, Levothyroxinum D12 5 г, Araneus diadematus D6 5 г, Geranium robertianum D4 10 г, Nasturtium officinale D4 10 г, Ferrum jodatum D12 10 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% объемных.

**Показания к применению:**

В комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита, лимфаденита неспецифической этиологии.

**Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Капли: в случае заболевания щитовидной железы препарат не применять без предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Раствор для инъекций: внутримышечно по 1,1 мл (содержимое 1 ампулы) 1–3 раза в неделю в течение 4 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.

Капли: внутрь по 15–20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. Курс лечения 8–12 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению лечащего врача. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период грудного вскармливания назначение препарата не рекомендуется.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Myosotis arvensis*

Хронический бронхит (в т.ч. при лимфатизме и экссудативном диатезе), повышенная потливость, особенно по ночам.

*Veronica officinalis*

Хронический бронхит, цистит, дерматозы.

*Teucrium scorodonia*

Хронические воспаления верхних дыхательных путей (например, полипозный ринит), гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит.

*Pinus sylvestris*

Воспаления дыхательных путей, экземы, крапивница.

*Gentiana lutea*

Расстройства пищеварения (метеоризм, диарея).

*Equisetum hyemale*

Заболевания почек и мочевыводящих путей.

*Sarsaparilla*

Кожные высыпания; воспаления мочеполовых органов; ревматизм.

*Scrophularia nodosa*

Состояния слабости, уплотнение желез.

*Juglans regia*

Гнойные кожные высыпания, воспаления лимфатических узлов, нарушения функций печени.

*Calcium phosphoricum*

Конституциональное средство при лимфатизме, состояниях истощения; потеря аппетита, недостаток кальция, заболевания позвоночника.

*Natrium sulfuricum*

Функциональные расстройства печени и желчного пузыря, бронхиальная астма, ревматизм, ухудшение состояния при влажной погоде.

*Fumaria officinalis*

Хронические зудящие экземы при нарушениях функций печени.

*Levothyroxinum*

Оказывает воздействие на процессы обмена веществ, активизирует процессы окисления во всем организме.

*Araneus diadematus*

Периодически повторяющиеся невралгии, приступы лихорадки; нарушения чувствительности, заболевания суставов; ухудшение состояния при холодной погоде.

*Geranium robertianum*

Диарея, кровотечения, изъязвления, мочеполовые расстройства, хронические ангины.

*Nasturtium officinale*

Раздражения мочевыводящих путей (диуретическое воздействие).

*Ferrum iodatum*

Заболевания щитовидной железы в сочетании с ее гиперфункцией; воспаление почек, увеличение лимфатических желез.

## Люффель Luffeel

Спрей назальный  
гомеопатический, 20 мл.

## Люффель Н Luffeel N

Таблетки для рассасывания  
гомеопатические, 50 шт.



### Состав:

Спрей: (на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Luffa operculata D4 10 г, Luffa operculata D12 10 г, Luffa operculata D30 10 г, Thryallis glauca D4 10 г, Thryallis glauca D12 10 г, Thryallis glauca D30 10 г, Histamine D12 5 г,

Histamine D30 5 г, Histamine D200 5 г, Sulfur D12 5 г, Sulfur D30 5 г, Sulfur D200 5 г. *Вспомогательные компоненты:* консервант – бензалкония хлорид 0,01%; натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

Таблетки: (на 1 таблетку): *Активные компоненты:* Aralia racemosa D1 25 мг, Arsenum iodatum D8 25 мг, Lobelia inflata D6 25 мг, Luffa operculata D12 25 мг. *Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

### Показания к применению:

Аллергический ринит.

### Противопоказания:

Спрей: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к бензалкония хлориду; детский возраст (до 6 лет).

Таблетки: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 3 лет).

При заболеваниях щитовидной железы не следует применять препарат без консультации врача.

### Применение при беременности и в период лактации:

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только после консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Спрей: Препарат впрыскивают по 1–2 дозы в каждый носовой ход 3 раза в день.

Курс лечения при острых состояниях – не дольше одной недели. Увеличение

курса лечения возможно только по рекомендации врача. Применение препарата у детей от 6-ти лет возможно по назначению и под контролем врача.

Таблетки: Препарат применяется по 1 таблетке 3 раза в день. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении двух часов. Таблетку следует медленно рассасывать во рту до полного растворения. Средний курс лечения – 4 недели. Продолжительность курса лечения может быть увеличена по рекомендации врача. Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

Спрей: В редких случаях может наблюдаться раздражение слизистой оболочки носа, сопровождающееся жжением, может быть усилена секреция из носа, а также наблюдаться носовое кровотечение. В очень редких случаях возможно возникновение бронхоспазма у пациентов с предрасположенностью к астме. В этих случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Таблетки: При приеме больших количеств данного лекарственного средства у людей с непереносимостью молочного сахара (лактозы) могут наблюдаться диспептические явления (слабительный эффект, метеоризм и др.)

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

**Особые указания:**

Рекомендуется одновременный прием таблеток Люффель Н и назального спрея Люффель, поскольку назальный спрей оказывает локальный эффект, а таблетки – системное действие.

Если аллергеном является пыльца, рекомендуется приблизительно за 4 недели до появления пыльцы принимать таблетки Люффель Н, а с появлением пыльцы – дополнительно применять назальный спрей Люффель. Продолжительность курса лечения устанавливается лечащим врачом.

При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Aralia racemosa*

Аллергическое заболевание дыхательных органов, сенная лихорадка (аллергический ринит) или астма.

*Arsenum jodatatum*

Бронхит.

*Lobelia inflata*

Нарушения дыхательного центра, сопровождающиеся падением кровяного давления.

*Luffa operculata*

Сенная лихорадка (аллергический ринит).

*Thyallis glauca (Galphimia glauca)*

Кожные аллергии и аллергии на слизистых оболочках.

*Histamine*

Аллергические кожные заболевания и заболевания слизистых оболочек.

*Sulfur*

Острые и хронические воспаления органов дыхания.

## Момордика композитум *Momordica compositum*

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, 2,2 мл.

**Состав:**

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:*

*Momordica balsamina* D6, *Iodum* D8,

*Podophyllum peltatum* D6, *Mercurius solubilis Hahnemanni* D8, *Ceanothus ameri-*

*canus* D6, *Carbo vegetabilis* D10, *Lycopodium clavatum* D6, *Lachesis mutus* D10,

*Mandragora e radice siccato* D8, *Argentum nitricum* D12, *Veratrum album* D4 по 22

мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

**Показания к применению:**

Препарат применяется при лечении хронического панкреатита.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания щитовидной железы.

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно; курс лечения 4 недели.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях препарат следует отменить. На первой неделе лечения возможно кратковременное обострение симптомов заболевания (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Momordica balsamina*

Поносы, боли при вздутиях кишечника.

*Jodum*

Гиперфункция щитовидной железы; фурункулез, угри.

*Podophyllum peltatum*

Нарушения функций печени и желчного пузыря, после операций на желчном пузыре, при рвоте.

*Mercurius solubilis Hahnemanni*

Воспаления желез, истощение.

*Ceanothus americanus*

Увеличение селезенки.

*Carbo vegetabilis*

Слабость пищеварительных органов, склонность к вздутиям.

*Lycopodium clavatum*

Воспаления и заболевания печени и желчного пузыря, расстройства пищеварительного тракта (с диспепсией и метеоризмом), заболевания обмена веществ, психические расстройства и депрессии.

*Lachesis mutus*

Заболевания желез, психические расстройства и депрессии, жалобы после приема пищи, метеоризм.

*Mandragora e radice siccatu*

Комплекс гастрокардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной кишки, холецистопатия, гепатопатии, чувство переполненности желудка после небольшого количества пищи.

*Argentum nitricum*

Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени, диспепсия, метеоризм, икота, вздутие кишечника, колики кишечника, жидкий стул.

*Veratrum album*

Нарушения кровообращения при инфекционных заболеваниях, поносы, психические нарушения при повышенной возбудимости.

## Мукоза композитум® Mucosa compositum®

Раствор для внутримышечного  
и подкожного введения  
гомеопатический,  
ампулы по 2,2 мл.



### Состав:

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Mucosa nasalis suis D8 22 мкл, Mucosa oris suis D8 22 мкл, Mucosa pulmonis suis D8 22 мкл, Mucosa oculi suis D8 22 мкл, Mucosa vesicae felleae suis D8 22 мкл, Mucosa vesicae urinariae suis D8 22 мкл, Mucosa pylori suis D8 22 мкл, Mucosa duodeni suis D8 22 мкл, Mucosa jejuni suis D8 22 мкл, Mucosa ilei suis D8 22 мкл, Mucosa coli suis D8 22 мкл, Mucosa recti suis D8 22 мкл, Mucosa ductus choledochi suis D8 22 мкл, Mucosa oesophagi suis D8 22 мкл, Ventriculus suis D8 22 мкл, Pankreas suis D10 22 мкл, Argentum nitricum D6 22 мкл, Atropa belladonna D10 22 мкл, Oxalis acetosella D6 22 мкл, Semecarpus anacardium D6 22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл, Lachesis mutus D10 22 мкл, Ipsecacuanha D8 22 мкл, Nux vomica D13 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Kreosotum D10 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D8 22 мкл, Colibacillinum-Nosode D28 22 мкл, Marsdenia cundurango D6 22 мкл, Kalium bichromicum D8 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 22 мкл, Mandragora e radice siccata D10 22 мкл, Momordica balsamina D6 22 мкл, Seanothus americanus D4 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.

### Показания к применению:

Воспалительные заболевания слизистых оболочек различной локализации, в том числе желудочно-кишечного тракта, верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюнктивы.

### Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### Применение при беременности и лактации:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

При острых стадиях заболевания ежедневно, при хронических заболеваниях 1–3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно. Курс терапии при острых стадиях заболевания 2–5 недель, при хронических заболеваниях (особенно гастриты, колиты) не менее 6 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

**Побочное действие:**

В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию этим препаратом следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Ventriculus suis*

Стимулирующее воздействие при функциональных нарушениях и ретоксических поражениях, например, хроническом гастрите (с язвами или без них), ахилии, изжоге.

*Mucosa nasalis suis*

Стимуляция при функциональных нарушениях слизистой оболочки и ее ретоксических поражениях, например, рините и воспалении придаточных пазух носа; бронхиальная астма, язва двенадцатиперстной кишки.

*Mucosa oris suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, гингивите.

*Mucosa pulmonis suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, бронхите.

*Mucosa oculi suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например, конъюнктивите.

*Mucosa vesicae felleae suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных нарушениях, например, холангите и холецистите.

*Mucosa vesicae urinariae suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, воспалении мочевого пузыря.

*Mucosa pylori suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, при язве желудка или привратника желудка.

*Mucosa duodeni suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, дуодените (с язвами или без них).

*Mucosa oesophagi suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, изжоге.

*Mucosa jejuni suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, дуодените и еуните.

*Mucosa ilei suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, воспалении подвздошной кишки.

*Mucosa coli suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, колите.

*Mucosa recti suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, колите, запорах.

*Mucosa ductus choledochi suis*

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, холангите и желчнокаменной болезни.

*Pankreas suis*

Панкреопатии, метеоризм, вздутие кишечника, хронический энтерит, маразм, кахексия.

*Argentum nitricum*

Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени, боли при различных воспалениях слизистых оболочек.

*Atropa belladonna*

Воспаления миндалин, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов, сопровождающиеся повышением температуры.

*Oxalis acetosella*

Гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (в сочетании с рвотой), диарея, гепатопатия в сочетании с диспепсией, стоматит.

*Semecarpus anacardium*

Слабость кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, нервное истощение, депрессии, навязчивые идеи.

*Phosphorus*

Воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; тяжелые инфекции, медленное выздоровление, состояния истощения; глазные заболевания, депрессии.

*Lachesis mutus*

Воспаления и кровотечения слизистых оболочек, психические расстройства, депрессии.

*Ipecacuanha*

Бронхит, бронхиальная астма, коклюш, воспаления пищеварительного тракта, кровотечения из слизистых оболочек.

*Nux vomica*

Воспаления дыхательных путей, воспаления и судороги пищеварительного тракта, расстройства печени и желчного пузыря, запоры, жалобы после приема пищи, алкоголя, табака и лекарств; заболевания мочевыводящих путей, судороги полых органов, бессонница, повышенная нервная возбудимость, депрессии.

*Veratrum album*

Нарушения кровообращения; заболевания, сопровождаемые поносом; нервные расстройства в сочетании с повышенной возбудимостью.

*Pulsatilla pratensis*

Воспаления дыхательных путей и склонность к простудам; воспаления, расстройства пищеварительного тракта; воспаления мочевого пузыря и мочевыводящих органов; воспаления глаз, отит; головные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.

*Kreosotum*

Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; возрастные заболевания.

*Sulfur*

Острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; недостаточность функций печени и расстройства пищеварительного тракта; бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.

*Natrium diethyloxalaceticum*

Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; снижение иммунитета, повышенная чувствительность к белку и жирам (но не к сахару!); острый и хронический гастрит.

*Colibacillinum-Nosode*

Кишечные инфекции, метеоризм, холангит, желчнокаменная болезнь, воспаление желчного пузыря, воспаление мочевого пузыря.

*Marsdenia cundurango*

Трещины и язвы на губах и в области заднего прохода, воспаления и сужения пищевода; для активации функций органов пищеварения.

*Kalium bichromicum*

Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевыводящих органов.

*Hydrastis canadensis*

Нагноения слизистых оболочек, образование язв; воспаления и колики желчного пузыря, пищеварительного тракта.

*Mandragora e radice siccata*

Комплекс гастрокардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной кишки, холецистопатии, гепатопатии, чувство переполнения желудка после приема небольшого количества пищи.

*Momordica balsamina*

Поносы, колики, вздутия кишечника.

*Ceanothus americanus*

Увеличение селезенки.

## Нервохель® Nervoheel®

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.

**Состав:**

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

Acidum phosphoricum D4 60 мг, Ignatia D4 60

мг, Sepia officinalis D4 60 мг, Psorinum-

Nosode D12 60 мг, Kalium bromatum D4 30 мг,

Zincum valerianicum D4 30 мг. *Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

**Показания к применению:**

Повышенная нервная возбудимость, неврозоподобные реакции в климактерическом периоде, нарушения засыпания, нарушения сна.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 3 лет).

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Для взрослых: рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин. до еды или спустя 1 час после приема пищи. Курс лечения – 2–3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после консультации с врачом. Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Acidum phosphoricum*

Состояния физического и психического истощения.

*Ignatia*

Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.

*Sepia officinalis*

Различные расстройства женских половых органов, головные боли, бессонница, состояния истощения, психические расстройства и депрессии (особенно в климактерический период).

*Psorinum-Nosode*

Состояния слабости, головные боли, депрессии.

*Kalium bromatum*

Состояния возбуждения центральной нервной системы, церебральная эпилепсия, ночные кошмары, бессонница, нарушения памяти.

*Zincum valerianicum*

Бессонница на нервной почве, нервные боли.

## Нукс вомика-Гомакорд Nux vomica-Номассорд

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.

**Состав:**

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:*  
Strychnos nux-vomica D2 0,2 г, Strychnos nux-vomica D10 0,2 г, Strychnos nux-vomica D15 0,2 г, Strychnos nux-vomica D30 0,2 г, Strychnos nux-vomica D200 0,2 г,



Strychnos nux-vomica D1000 0,2 г, Bryonia D2 0,2 г, Bryonia D6 0,2 г, Bryonia D10 0,2 г, Bryonia D15 0,2 г, Bryonia D30 0,2 г, Bryonia D200 0,2 г, Bryonia D1000 0,2 г, Lycopodium clavatum D3 0,3 г, Lycopodium clavatum D10 0,3 г, Lycopodium clavatum D30 0,3 г, Lycopodium clavatum D200 0,3 г, Lycopodium clavatum D1000 0,3 г, Citrullus colocynthis D3 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 0,3 г, Citrullus colocynthis D200 0,3 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

**Показания к применению:**

Препарат применяется в комплексной терапии при спастических колитах.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).

**Применение при беременности и в период лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность лечения составляет в среднем 2–5 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Strychnos nux-vomica*

Воспаления и судороги пищеварительного тракта; расстройства печени и желчного пузыря; запоры, геморрой; жалобы после приема пищи, употребления никотина, алкоголя и лекарств; головные боли и невралгии, судороги полых органов; бессонница, повышенная нервная возбудимость, депрессии.

*Bryonia cretica*

Острые воспаления брюшины, печени. Метеоризм. Поносы, сменяющиеся запорами.

*Lycopodium clavatum*

Воспаления и расстройства печени и желчного пузыря; расстройства пищеварения; психические расстройства и депрессии.

*Citrullus colocynthis*

Болезненные судороги пищеварительного тракта и желчевыводящей системы.

## Овариум композитум Ovarium compositum

Раствор для инъекций  
гомеопатический,  
ампулы по 2,2 мл.



### Состав:

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Ovarium suis D8, Placenta suis D10, Uterus suis D10, Salpinx suis D10, Hypophysis suis D13, Cypripedium calceolus var. pubescens D6, Lilium tigrinum D4, Pulsatilla pratensis D18, Aquilegia vulgaris D4, Sepia officinalis D10, Lachesis mutus D10, Apisinum D8, Kreosotum D8, Bovista D6, Ipecacuanha D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D10, Hydrastis canadensis D4, Acidum cis-aconitinum D10, Magnesium phosphoricum D10 по 22,0 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

### Показания к применению:

Применяется в качестве симптоматического средства у женщин в составе комплексной терапии при лечении нарушений менструального цикла.

### Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Применяют по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения определяется после консультации с врачом.

### Побочное действие:

В случае повышенного слюноотделения после приема препарата, необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Ингредиенты и показания к ним:***Ovarium suis*

Нарушения функций овуляции. Дисменорея, аменорея, менорагии; климактерические расстройства. Остеопороз.

*Placenta suis*

Дисменорея, нарушения периферического кровоснабжения.

*Uterus suis*

Дисменорея.

*Salpinx suis*

Дисменорея, бесплодие вследствие воспаления фаллопиевых труб.

*Hypophysis suis*

Головокружения; нарушения ферментных функций, гипофизарное ожирение, дистрофия, недостаточность функций яичников, нарушения менструации и овуляции, хронические артрозы и первичный хронический полиартрит; расстройства функций соединительной ткани, нарушения роста, дисменорея, лакторея, нейродермит и прочие кожные заболевания.

*Cypripedium calceolus var. pubescens*

Бессонница.

*Lilium tigrinum*

Опущение матки в климактерический период, воспаления и боли в женских половых органах, функциональные расстройства сердечно-сосудистой деятельности, депрессии, состояния раздражения.

*Pulsatilla pratensis*

Воспаления и расстройства женских половых органов, воспаление влагалища, сопровождающееся выделениями; регулятивные расстройства; расстройства в период беременности; головные боли, бессонница, нервно-психические расстройства, депрессии.

*Aquilegia vulgaris*

Бессонница на нервной почве (особенно в климактерический период).

*Sepia officinalis*

Различные расстройства женских половых органов, головные боли, бессонница, состояния нервно-психического истощения, депрессии (особенно в климактерический период).

*Lachesis mutus*

Жалобы в климактерический период, неврологические расстройства и депрессии.

*Apisinum*

Воспаления и заболевания, сопровождающиеся скоплениями жидкости в тканях и полостях тела; аллергии.

*Kreosotum*

Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов, возрастные заболевания.

*Bovista*

Маточные кровотечения (особенно в период менструации), дисменорея, бели.

*Ipecacuanha*

Кровотечения из слизистых оболочек, тошнота и рвота, в т.ч. неукротимая рвота.

*Mercurius solubilis Hahnemanni*

Воспаления слизистых оболочек мочеполовых органов.

*Hydrastis canadensis*

Нагноения слизистых оболочек, образование язв, полипов.

*Acidum cis-aconicum*

Воздействует на окислительно-восстановительные системы и на цикл лимонной кислоты; при иммунной слабости, стенокардии, тахикардии; болях в костях по ночам, в т.ч. в позвоночнике (инволюционный остеопороз); резкая смена настроений, депрессии.

*Magnesium phosphoricum*

Хронический болевой синдром.

## Окулохель Oculoheel

Глазные капли  
гомеопатические  
в тубиках-капельницах,  
по 0,45 мл.



### Состав:

(1 тубик-капельница 0,45 мл): *Активные компоненты:* *Euphrasia officinalis*

D5 110,7 мг, *Cochlearia officinalis* D5 110,7 мг, *Jaborandi* D5 110,7 мг, *Echinacea*

*angustifolia* D5 110,7 мг. *Вспомогательные вещества:* натрия хлорида, натрия фосфат однозамещенный дигидрат, натрия фосфат двузамещенный дигидрат.

### Показания к применению:

Воспаления, раздражения глаз, повышенная утомляемость глаз после зрительных нагрузок, слезотечение, светобоязнь.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период лактации.

### Применение при беременности:

В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

**Способ применения и дозы:**

Отделить один тубик-капельницу поворотом и отрывом по линии, повернуть и оторвать колпачок. Запрокинуть голову, держать тубик-капельницу вертикально, капать препарат непосредственно в конъюнктивальный мешок глаза, надавливая на тубик-капельницу. Капать в больной глаз по 1–2 капли 4 раза в день в течение 10 дней.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

**Особые указания:**

Тубик-капельницу можно использовать только один раз. Содержимого тубика-капельницы достаточно для однократного применения, т.е. закапывания один раз в левый и (или) правый глаз, если это необходимо. Открывать тубик-капельницу можно только перед самым закапыванием. Использованный тубик-капельницу выбросить, даже если там остался раствор, нельзя применять его в дальнейшем.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Euphrasia officinalis*

Воспалительные заболевания глаз. Воспаления верхних дыхательных путей.

*Jaborandi*

Заболевания глаз, повышенное потоотделение.

*Echinacea angustifolia*

Поддерживающая терапия острых и лихорадочных инфекций.

## Остеохель С Osteoheel S

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.

**Состав:**

(для 1 таблетки): *Активные компоненты:*

Hekla-Lava D6 30 мг, Kalium jodatatum D4 30 мг,

Asa foetida D4 30 мг, Stillingia sylvatica D4 30

мг, Araneus diadematus D6 30 мг, Natrium sulfuricum D4 30 мг, Hydrargyrum oxyda-

tum rubrum D9 60 мг, Calcium phosphoricum D6 60 мг. *Вспомогательные веществ-*

*ва:* магния стеарат, лактоза.

**Показания к применению:**

В комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных заболеваний костной ткани и надкостницы.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и лактации:**

В связи с отсутствием клинических данных применение препарата при беременности и в период лактации не рекомендуется.

**Способ применения и дозы:**

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком. Длительность курса лечения согласовывается с врачом.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции.

Редко – повышенное слюноотделение. При появлении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

**Особые указания:**

Препарат имеет в своем составе ингредиент, содержащий йод, поэтому при заболеваниях щитовидной железы не применять без назначения врача. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу или фармацевту.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Hekla-Lava*

Воспаления кости и надкостницы, экзостозы (остеосклеротические очаги с анкилозом стремени при отосклерозе).

*Kalium jodatum*

Ревматизм мягких тканей, периостические проявления, боли в костях по ночам.

*Asa foetida*

Воспаления и гнойные процессы в костной ткани.

*Stillingia silvatica*

Боли в костях и надкостнице.

*Araneus diadematus*

Боли в суставах (ухудшение при влажной и холодной погоде).

*Natrium sulfurosum*

Ревматизм.

*Hydrargyrum oxydatum rubrum*

Нагноения кожи и слизистых оболочек, периостит, боли в костях по ночам, костные фистулы.

*Calcium phosphoricum*

Конституциональное средство при ревматизме; состояния истощения, недостаток кальция, заболевания позвоночника (остеохондроз с экзостозными образованиями).

## Плацента композитум *Placenta compositum*

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.

**Состав:**

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Placenta suis D6, Embryo suis D8, Vena suis D8, Arteria suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Hypophysis suis D10, Secale cornutum D4, Acidum sarcolacticum D4, Nicotiana tabacum D10, Strophanthus gratus D6, Aesculus hippocastanum D4, Melilotus officinalis D6, Cuprum sulfuricum D6, Natrium pyruvicum D8, Barium carbonicum D13, Plumbum jodatum D18, Vipera berus D10, Solanum nigrum D6 по 22,0 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

**Показания к применению:**

В комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания щитовидной железы.

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) внутримышечно через день. Средний курс лечения составляет 3 недели. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Placenta suis*

Нарушения периферического кровообращения, пролежни, болезненные трещины, экземы, язвы.

*Embryo suis*

Атеросклероз, мышечная дистрофия; для терапии клеточных фаз.

*Vena suis*

Нарушения кровоснабжения, судороги икроножных мышц, венозный стаз, язвы, варикозные расширения вен.

*Arteria suis*

Нарушения кровообращения, хромота.

*Funiculus umbilicalis suis*

Поражения соединительной ткани, атеросклероз, нарушения кровоснабжения.

*Hypophysis suis*

Головокружения, нарушения ферментативных функций, расстройства овуляции.

*Secale cornutum*

Мышечные судороги, нарушения кровоснабжения при заболеваниях артерий.

*Acidum sarcolacticum*

Мышечные боли; для вспомогательной терапии сахарного диабета.

*Tabacum*

Гипотония, ангина.

*Strophantus gratus*

Сердечная слабость.

*Aesculus hippocastanum*

Венозные застои и их последствия, геморрой.

*Melilotus officinalis*

Головные боли, спазмы сосудов.

*Cuprum sulfuricum*

Мышечные спазмы.

*Natrium pyruvicum*

Способствует детоксикации; диабетические нарушения кровоснабжения.

*Barium carbonicum*

Высокое артериальное давление, обызвествление сосудов.

*Plumbum jodatum*

Общее обызвествление сосудов, высокое давление.

*Vipera berus*

Слабость сердечно-сосудистой деятельности, ангина.

*Solanum nigrum*

Раздражения мозговых оболочек.

## Популюс композитум СР *Populus compositum SR*

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.

**Состав:**

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:*

*Populus tremuloides* Ø 10 мл, *Sabal serrulatum*

Ø 10 мл, *Capsicum annuum* D3 3 мл, *Bucco* D3 3

мл, *Orthosiphon aristatus* D3 3 мл, *Piper cubeba*

D3 3 мл, *Camphora* D3 3 мл, *Apis mellifica* D3 3 мл,

*Solidago virgaurea* D3 3 мл, *Scrophularia nodosa*

D3 3 мл, *Ononis spinosa* D3 3 мл, *Petroselinum crispum* D3 3 мл, *Cucurbita pepo* D3

3 мл, *Baptisia tinctoria* D3 3 мл, *Arctostaphylos uva-ursi* D3 3 мл, *Scilla* D3 3 мл,

*Equisetum hyemale* D3 3 мл, *Urtica urens* D3 3 мл, *Kreosotum* D5 3 мл, *Berberis vul-*

*garis* D5 3 мл, *Cantharis* D5 3 мл, *Mercurius sublimatus corrosivus* D8 3 мл,

*Terebinthina laricina* D6 3 мл. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 80% объемных.

**Показания к применению:**

В комплексной терапии заболеваний мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (в том числе, аденоме предстательной железы 1 стадии).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.



**Способ применения и дозы:**

Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждый час. Средний курс лечения составляет 1–3 месяца. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

**Побочные действия:**

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).

В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

В составе препарата содержится около 80% (объемных) этилового спирта.

Суточная доза препарата содержит около 0,24 г этилового спирта.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Populus tremuloides*

Цистит и функциональные расстройства мочевого пузыря.

*Sabal serrulatum*

Воспаления мочевыводящих путей, функциональные расстройства мочевого пузыря.

*Capsicum annuum*

Воспаления слизистых оболочек мочевого пузыря и мочеточников.

*Bucco*

Заболевания мочевыводящих путей.

*Orthosiphon aristatus*

Камни в почках и мочевом пузыре; мочекислый диатез.

*Piper cubeba*

Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов.

*Camphora*

Простудные заболевания, состояния коллапса.

*Apis mellifica*

Воспаления и заболевания, сопровождающиеся отеками; аллергии.

*Solidago virgaurea*

Функциональные расстройства мочевыводящей системы.

*Scrophularia nodosa*

Состояния слабости, уплотнение желез.

*Ononis spinosa*

Водянка.

*Petroselinum crispum*

Воспаления мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

*Cucurbita pepo*

Рвота, первая стадия аденомы простаты.

*Baptisia tinctoria*

Тяжелые инфекции, сопровождающиеся жаром.

*Arctostaphylos uva-ursi*

Воспаления мочевыводящих путей.

*Scilla*

Сердечная слабость, функциональные расстройства мочевого пузыря.

*Equisetum hyemale*

Заболевания почек и мочевыводящих путей.

*Urtica urens*

Заболевания почек, подагра.

*Kreosotum*

Воспаления мочеполовых органов, склонность к кровотечениям, возрастные заболевания.

*Berberis vulgaris*

Сухие кожные высыпания, заболевания печени и желчного пузыря, заболевания почек и мочевого пузыря, например, нефрит, почечнокаменная болезнь, воспаление мочевого пузыря.

*Cantharis*

Острые воспаления мочеполовой системы (нефрит, цистит, уретрит, простатит).

*Mercurius sublimatus corrosivus*

Острые воспаления слизистых оболочек мочевыводящих путей.

*Terebinthina laricina*

Нефрит, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, гематурия.

## Псоринохель Н Psorinoheel® N

Раствор для  
внутримышечного  
введения  
гомеопатический,  
ампулы по 1,1 мл.



### Состав:

(на 1 ампулу 1,1 мл): *Активные*

*компоненты:* Psorinum D10 1,10 мг, Medorrhinum D12 1,10 мг, Sulfur D6 1,10 мг, Thuja occidentalis D6 1,10 мг, Bufo bufo D10 1,10 мг, Natrium chloratum 1,10 мг, Vaccinium D8 1,10 мг, Bismutum kalium iodidum D5 0,55 мг, Nerium oleander D4 0,55 мг, Cicuta virosa D5 0,55 мг, Bacillinum humanum-Nosode D12 0,55 мг.

*Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

### Показания к применению:

Препарат применяется для лечения экземы.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст 18 лет.

### Способ применения и дозы:

Препарат назначается внутримышечно по 1,1 мл через день в течение 4 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения устанавливается лечащим врачом.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Во время беременности и в период грудного вскармливания назначение гомеопатических средств возможно только после консультации с врачом.

### Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

### Ингредиенты и показания к ним:

#### *Psorinum*

Различные хронические кожные заболевания; хронические воспаления слизистых оболочек, особенно дыхательных путей; состояния общей слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний; головные боли, депрессии.

*Medorrhinum*

Воспаления слизистых оболочек мочеполовых органов, дыхательных путей, пищеварительного тракта; ревматизм; резкая смена настроений, преждевременное старение.

*Sulfur*

Различные кожные заболевания, особенно хронические; зудящие экземы и кожные нагноения; острые и хронические воспаления дыхательных органов, пищеварительного тракта, мочеполовой системы; нарушение функций печени и органов пищеварения; судороги, геморрой и кровотечения; сердечно-сосудистые заболевания, нарушения артериального давления; ревматические заболевания, бессонница, нервные расстройства; состояния общей слабости, психические нарушения и депрессии.

*Thuja occidentalis*

Заболевания кожи и слизистых оболочек; нарушения пищеварения, ревматизм, депрессии; склонность к пролиферативным процессам (бородавкам, полипам и т.п.), а также болезненные состояния, вызванные очаговыми интоксикациями.

*Bufo bufo*

Поражения мозга в сочетании с нарушениями поведения; судороги и церебральные приступы; воспаления кожи и желез со склонностью к нагноениям; боли в сердце на нервной почве.

*Natrium chloratum*

Мигрени, заболевания пищеварительного тракта, депрессии; кожные заболевания.

*Vaccinium*

Осложнения после прививок оспы, воспалительные кожные заболевания, головные боли.

*Bismutum kalium iodidum*

Последствия сифилиса; симптомы, схожие с параличом; нарушения мозговых функций.

*Nerium oleander*

Органические сердечные заболевания; расстройства пищеварения; мокнущие экземы, паралич, ревматизм.

*Cicuta virosa*

Гнойные очаги на коже и слизистых оболочках; судороги, церебральные приступы.

*Bacillinum humanum-Nosode*

Воспаления дыхательных путей, кожные заболевания, головные боли, состояния общей слабости.

## Пульсатилла композитум *Pulsatilla compositum*

Раствор для инъекций  
гомеопатический,  
ампулы по 2,2 мл.



### **Состав:**

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:*  
*Pulsatilla pratensis* D6, *Sulfur* D8, *Cortisonum aceticum* D18 по 22 мкл.  
*Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

### **Показания к применению:**

Для лечения гипогалактии.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### **Способ применения и дозы:**

Кратность и продолжительность введения устанавливает лечащий врач индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно.  
Курс лечения – 2 недели.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, в редких случаях – головокружение. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

### **Ингредиенты и показания к ним:**

#### *Pulsatilla pratensis*

Кожные заболевания, судороги; воспаления дыхательных путей и склонность к простудам; воспаления и расстройства пищеварительного тракта; воспаления и расстройства женских половых органов; расстройства в период беременности; воспаления мочевого пузыря, расстройства мочеиспускания; ревматические заболевания, воспаления глаз; отит; корь, свинка; головные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.

### *Sulfur*

Различные, особенно хронические кожные заболевания; зудящие экземы и кожные нагноения; острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; нарушения функций печени и органов пищеварения; судороги, геморрои и кровотечения; сердечно-сосудистые заболевания, нарушения давления; ревматические заболевания; бессонница, нервные расстройства, состояния общей слабости, депрессии.

### *Cortisonum aceticum*

Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани.

## **Ренель®** **Reneel®**

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.



### **Состав:**

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

Alumina D12 75 мг, Berberis vulgaris D2 15 мг,

Acidum nitricum D4 30 мг, Cantharis D5 30 мг,

Plumbum aceticum D6 30 мг,

Pareira brava D3 30 мг, Sabal serrulatum D2 30 мг, Causticum Hahnemanni D4 60 мг.

*Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

### **Показания к применению:**

Препарат применяется при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, мочекаменной болезни.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 3 лет).

### **Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### **Способ применения и дозы:**

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или спустя 1 час после приема пищи. В острых случаях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Курс лечения определяется лечащим врачом. Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом:

1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Berberis vulgaris*

Сухие кожные высыпания, поражения печени и желчного пузыря; заболевания почек и мочевого пузыря, почечнокаменная болезнь.

*Acidum nitricum*

Воспаления слизистых оболочек; заболевания, сопровождающиеся истощением; депрессии.

*Cantharis*

Острые воспаления мочеполовых органов.

*Plumbum aceticum*

Боли в парализованных конечностях; паротит; нефросклероз, хронический нефрит, альбуминурия, тенезмы мочевого пузыря, странгурия.

*Pareira brava*

Расстройства мочевого пузыря, воспаления мочеиспускательного канала, увеличение предстательной железы.

*Sabal serrulatum*

Воспаления мочевыводящих путей, заболевания мочевого пузыря.

*Causticum Hahnemanni*

Заболевания мочевыводящих путей, депрессии.

*Alumina*

Сухие кожные высыпания, хронические воспаления слизистых оболочек, атония мочевого пузыря.

## Сабаль-Гомаккорд Sabal-Homaccord®

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.



### Состав:

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Sabal serrulatum Ø 0,9 мл; Sabal serrulatum D10, D30 по 0,3 мл, Hepar sulfuris D10, D15, D30, D200 по 0,7 мл. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 45% объемных.

### Показания к применению:

В комплексной терапии дизурических расстройств при аденоме предстательной железы 1 стадии.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды)

3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды.

При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель

каждые 15 минут в течение

2 часов. Курс лечения – 5 недель.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

### Особые указания:

При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

### Ингредиенты и показания к ним:

#### *Sabal serrulatum*

Воспаления мочевыводящих путей, расстройства мочевого пузыря (например, недержание мочи, ишурия при аденоме простаты).

#### *Hepar sulfuris*

Воспаления слизистых оболочек; повышенная нервная возбудимость; аденома простаты в сочетании с нарушениями мочеиспускания.

## Солидаго композитум С Solidago compositum S

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.



### Состав:

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:*

Solidago virgaurea D3, Berberis vulgaris D4, Vesica urinaria suis D8, Pyelon suis D10, Ureter suis D10, Urethra suis D10, Terebinthina laricina D6, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Arsenicum album D28, Cuprum sulfuricum D6, Bucco D8, Hepar sulfuris D10, Capsicum annum D6, Orthosiphon aristatus D6, Equisetum hyemale D4, Pareira brava D6, Cantharis D6, Apisinum D8, Baptisia tinctoria D4, Natrium pyruvicum D10, Pyrogenium-Nosode D198, Sarsaparilla D6, Bacterium coli-Nosode D13, Coxsackie-Virus A9-Nosode D8, Argentum nitricum D6 по 22 мкл.

*Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

### Показания к применению:

В комплексной терапии острого и хронического цистита.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Применение при беременности и лактации:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно.

Курс лечения – 3 недели.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях препарат следует отменить. В некоторых случаях возможна тошнота.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать

прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Solidago virgaurea*

Нарушение выделительных функций почек (диуретическое воздействие).

*Berberis vulgaris*

Сухие кожные высыпания, заболевания печени и желчного пузыря; заболевания почек и мочевого пузыря, например, нефрит, почечнокаменная болезнь, цистит.

*Vesica urinaria suis*

Цистит, тенезмы мочевого пузыря, аденома простаты.

*Pyelon suis*

Гидронефроз, хронический пиелит, почечнокаменная болезнь.

*Ureter suis*

Нарушения экскреторных функций почек, почечнокаменная болезнь, гидронефроз, нефроз.

*Urethra suis*

Хронические раздражения уретры и мочеполовых органов, сужение мочеиспускательного канала.

*Terebinthina laricina*

Нефрит, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, гематурия.

*Hydrargyrum bichromatum*

Острые воспаления слизистых оболочек мочевыводящих путей.

*Acidum arsenicosum*

Воспаления в различных органах и тканях; доброкачественные и злокачественные новообразования.

*Cuprum sulfuricum*

Спазмы гладкой мускулатуры, судороги по ночам.

*Busso*

Заболевания мочеполовых органов.

*Hepar suis*

Воспаления и нагноения слизистых оболочек; повышенная нервная возбудимость; аденома простаты в сочетании с расстройствами мочеиспускания.

*Capsicum annuum*

Воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря и мочеточников.

*Orthosiphon aristatus*

Камни в почках и мочевом пузыре, мочекислый диатез.

*Equisetum hiemale*

Заболевания почек и мочевыводящих путей.

*Pareira brava*

Заболевания мочевого пузыря, воспаления мочеиспускательного канала, увеличение предстательной железы.

*Cantharis*

Острые воспаления слизистых оболочек и мочеполовых органов.

*Apisinum*

Воспаления и заболевания, сопровождающиеся отеками; аллергии.

*Baptisia*

Тяжелые лихорадочные инфекции; сепсис; нарушения сознания.

*Natrium pyruvicum*

Воздействующий фактор в цикле Кребса и окислительно-восстановительных систем.

*Pyrogenium-Nosode*

Тяжелые лихорадочные инфекционные заболевания; склонность к септическим состояниям.

*Sarsaparilla*

Раздражения мочеполовых органов.

*Bacterium coli-Nosode*

Инфекции мочевыводящих путей, например, пиелит, цистит, мочевые тенезмы (ухудшение состояния при влажной погоде).

*Coxsackie-Virus A9-Nosode*

Заболевания мочевыводящих путей (например, цистопиелит, воспаление мочевого пузыря, уретрит, простатит), заболевания придатков яичек.

*Argentum nitricum*

Психосоматические заболевания пищеварительного тракта; мигрени; хронические катары слизистых оболочек, недержание, нефрит.

## Спаскупрель® Spascupreel

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.



### Состав:

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

*Citrullus colocynthis D4 30 мг, Ammonium bromatum D4 30 мг, Atropinum sulfuricum D6 30 мг,*

*Veratrum album D6 30 мг, Magnesium phosphoricum D6 30 мг, Gelsemium semper-virens D6 30 мг, Passiflora incarnata D2 15 мг, Agaricus D4 15 мг, Chamomilla recuti-*

та D3 15 мг, Cuprum sulfuricum D6 15 мг, Aconitum napellus D6 60 мг.

*Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

**Показания:**

Спастический болевой синдром (спазмы желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевыводящих путей); спазмы поперечно-полосатой мускулатуры (мышечная ригидность, мышечное напряжение).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст (до 3 лет).

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс терапии – 2–3 недели, по указанию врача продолжительность лечения может быть увеличена. Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности. Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Citrullus colocynthis*

Болезненные судороги пищеварительного тракта (в т.ч. желчные колики), мочеполовых органов; невриты и невралгии, особенно лицевого нерва; ишиас.

*Ammonium bromatum*

Воспаления дыхательных путей, кашель, спастический или астматический бронхит.

*Atropinum sulfuricum*

Воспаления верхних дыхательных путей и экскреторных органов, включая кожу; спазмы гладкомышечных полых органов.

*Veratrum album*

Нарушения кровообращения; поносы, невралгии; повышенная раздражительность.

*Magnesium phosphoricum*

Спазмы органов пищеварения; регулярно повторяющиеся боли.

*Gelsemium sempervirens*

Головные боли, нервные расстройства, судороги.

*Passiflora incarnata*

Бессонница, судороги, чувство беспокойства.

*Agaricus*

Состояния возбуждения; ятрогенные заболевания и наркотическая зависимость; заболевания мочевого пузыря и органов пищеварения.

*Chamomilla recutita*

Воспаления органов дыхательной системы, боли при прорезывании зубов; воспаления и спазмы органов пищеварения, женских половых органов; частые боли; возбуждения и депрессии.

*Ciprum sulfuricum*

Судороги гладкой мускулатуры; спастический кашель по ночам.

*Aconitum napellus*

Острые воспалительные заболевания; невралгии и невриты; заболевания органов кровообращения, сопровождающиеся чувством страха.

## Спигелон® Spigelon

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.



### Состав:

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

*Spigelia anthelmia* D3 30 мг, *Atropa belladonna*

D3 30 мг, *Bryonia* D3 30 мг, *Gelsemium semper-*

*virens* D3 30 мг, *Melilotus officinalis* D3 30 мг,

*Natrium carbonicum* D3 30 мг, *Acidum silicicum* D12 60 мг, *Thuja occidentalis* D12

60 мг. *Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

**Показания к применению:**

Препарат применяется при головной боли различного генеза (мигрень, головная боль при психоэмоциональном напряжении).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 3 лет.

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс лечения определяется врачом. Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 табл. содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Spigelia anthelmia*

Невралгии и головные боли.

*Atropa belladonna*

Лихорадочные воспаления; состояния церебрального возбуждения.

*Bryonia cretica*

Острые воспаления дыхательных путей, плевры, брюшины, печени; острый и хронический ревматизм; колющие боли (обостряющиеся при движении).

*Gelsemium sempervirens*

Головные и нервные боли.

*Melilotus officinalis*

Головные боли.

*Natrium carbonicum*

Слабоумие, депрессии (конституциональное средство; головные боли при умственном напряжении).

*Acidum silicicum*

Психическое и физическое истощение (конституциональное средство).

*Thuja occidentalis*

Депрессии.

## Струмель® Т Strumeel® Т

Таблетки для рассасывания  
гомеопатические, 50 шт.



### Состав:

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

*Euspongia officinalis* D3 150 мг, *Calcium iodatum*

D4 90 мг, *Fucus vesiculosus* D4 30 мг.

*Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

### Показания к применению:

В комплексной терапии заболеваний щитовидной железы с гипотиреозом (при заболеваниях щитовидной железы применение данного лекарственного средства не должно проводиться без предварительной консультации с лечащим врачом).

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к йоду, гиперфункция щитовидной железы; прием лекарственных препаратов, угнетающих функцию щитовидной железы; детский возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

### Применение при беременности и лактации:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Если лечащий врач не рекомендует иначе, следует использовать препарат 3 раза в день по 1 таблетке, медленно рассасывая во рту до полного растворения. Средний курс лечения составляет 12 недель.

**Побочное действие:**

Возможны тахикардия, раздражительность, потливость и другие симптомы тиреотоксикоза при длительных курсах лечения.

Возможны аллергические реакции.

**Передозировка:**

При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы; усиление симптомов тиреотоксикоза.

**Взаимодействие с другими препаратами:**

Возможно совместное применение с L-тироксином; по рекомендации и под контролем врача возможно снижение дозы L-тироксина.

При приеме других лекарственных средств следует посоветоваться с лечащим врачом.

**Особые указания:**

Струмель Т не заменяет препараты, назначаемые врачом при данном заболевании. При врачебном обследовании щитовидной железы врача необходимо поставить в известность о приеме данного препарата, в противном случае оценка результатов обследований может быть некорректна.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Euspongia officinalis*

Увеличение желез (в т.ч. щитовидной);  
заболевания коронарных артерий и аорты.

*Calcium iodatum*

Зоб.

*Fucus vesiculosus*

Избыточный вес, зоб.

## Тартефедрель Н Tartephedreel N

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.



### Состав:

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Kalium stibyltartaricum D4 10 г, Atropa belladonna D4 10 г, Natrium sulfuricum D4 10 г, Arsenum iodatum D6 10 г, Blatta orientalis D6 5 г, Lobelia inflata D4 5 г, Cephaelis ipecacuanha D4 5 г, Naphthalinum D6 5 г, Illicium verum D3 5 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

### Показания к применению:

Препарат применяется в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 6 лет).

### Применение при беременности и в период лактации:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность лечения составляет в среднем 2–4 недели. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача. Применение препарата у детей от 6 до 12 лет возможно по назначению и под контролем врача.

### Побочные действия:

Возможны аллергические реакции.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания:

При заболеваниях щитовидной железы не следует применять препарат без консультации с врачом.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать

прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Kalium stibyltartaricum*

Воспаления нижних дыхательных путей.

*Atropa belladonna*

Воспаления миндалин и дыхательных путей.

*Natrium sulfuricum*

Бронхиальная астма.

*Arsenum iodatum*

Насморк, бронхит.

*Naphthalinum*

Воспаления дыхательных путей, мочевыводящих путей; различные возрастные заболевания глаз; астматический бронхит, коклюш, эмфизема легких.

*Illicium verum*

Бронхит.

*Lobelia inflata*

Расстройства вегетативной нервной системы, коклюш, бронхиальная астма.

*Cephaelis ipecacuanha*

Бронхит, бронхиальная астма, коклюш.

*Blatta orientalis*

Бронхит, астма.

## Тестис композитум Testis compositum

Раствор для инъекций  
гомеопатический,  
ампулы по 2,2 мл.



**Состав::**

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Testis suis D4, Embryo suis D8, Glandula suprarenalis suis D13, Kalium picricum D6, Ginseng D4, Damiana D8,

Caladium seguinum D6, Cor suis D8, Cortisonum aceticum D13, Vitex agnus-castus D6, Selenium D10, Strychninum phosphoricum D6, Cantharis D8, Curare D8, Conium maculatum D28, Lycopodium clavatum D28, Phosphorus D8, Diencephalon suis D10, Magnesium phosphoricum D10, Ferrum phosphoricum D10, Manganum phosphoricum D8, Zincum metallicum D10, Acidum ascorbicum D6 по 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

**Показания к применению:**

Препарат применяют в комплексной терапии для стимуляции функции яичек при импотенции у мужчин репродуктивного возраста, снижении либидо, ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса.

**Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

По 1 ампуле подкожно, внутримышечно 1–3 раза в неделю.

Длительность курса определяется врачом.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции. При их развитии необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу или фармацевту.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Testis suis*

Импотенция, состояния истощения, преждевременное старение.

*Embryo suis*

Атеросклероз, мышечная дистрофия.

*Glandula suprarenalis suis*

Состояния истощения; недостаточность надпочечников.

*Kalium picrinicum*

Состояния истощения как следствие перенапряжений.

*Ginseng*

Состояния общей слабости.

*Damiana*

Половое бессилие.

*Caladium seguinum*

Синдром раздражения половых органов.

*Cor suis*

Нарушения коронарного кровоснабжения; сердечная недостаточность.

*Cortisonum aceticum*

Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани (остеопороз, остеомалация, остеохондроз).

*Vitex agnus-castus*

Половые расстройства у мужчин; нервное возбуждение, депрессии.

*Selenium*

Состояния общей слабости.

*Strychninum phosphoricum*

Нервное истощение.

*Cantharis*

Острые воспаления мочеполовых органов.

*Curare*

Параличи, судороги.

*Conium maculatum*

Обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); депрессии.

*Lycopodium clavatum*

Воспаления мочеполовых органов, возрастные заболевания; психические расстройства и депрессии.

*Phosphorus*

Воспаления мочеполовых органов; состояния истощения и замедленное выздоровление; боли в позвоночнике; снижение содержания кальция в костях (остеопороз, остеомалация).

*Diencephalon suis*

Регуляция вегетативных функций.

*Magnesium phosphoricum*

Невралгии; спазмы пищеварительного тракта.

*Ferrum phosphoricum*

Ревматические заболевания позвоночника.

*Manganum phosphoricum*

Состояния общей слабости в сочетании с анемией.

*Zincum metallicum*

Судороги и невралгии; заболевания позвоночника, головного и спинного мозга; состояния истощения и депрессии; бессонница.

*Acidum ascorbicum*

Воздействует на ферментные окислительно-восстановительные системы.

## Тонзилла композитум Tonsilla compositum

Раствор для инъекций  
гомеопатический,  
ампулы по 2,2 мл.



### Состав:

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Tonsilla suis D28, Acidum ascorbicum

D6, Nodus lymphaticus suis D8, Medulla ossis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Splen suis D10, Hypothalamus suis D10, Hepar suis D10, Embryo suis D13, Cortex glandulae suprarenalis suis D13, Pyrogenium-Nosode D198, Cortisonum aceticum D13, Pulsatilla pratensis D6, Acidum sarcosolacticum D6, Echinacea D4, Calcium phosphoricum D10, Aesculus hippocastanum D6, Kalium stibyltartaricum D6, Solanum dulcamara D4, Levothyroxinum D13, Coccus cacti D6, Ferrum phosphoricum D10, Gentiana lutea D6, Geranium robertianum D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D13, Barium carbonicum D28, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Sulfur D8, Psorinum-Nosode D28 по 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:*

вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

### Показания к применению:

Комплексная терапия хронического тонзиллита.

### Противопоказания:

Гиперчувствительность к одному из действующих или вспомогательных ингредиентов (в т.ч. чувствительность к растениям семейства Астровых, особенно к *Echinacea angustifolia*). С осторожностью назначать пациентам с прогрессирующими системными заболеваниями и аутоиммунными расстройствами.

### Способ применения и дозы:

Если не прописано иначе, 1 раз в неделю по 1 ампуле внутрь или внутримышечно. Длительность лечения определяет врач.

### Побочное действие:

В случае повышенного слюноотделения после приема препарата необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать

прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу или фармацевту.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Acidum ascorbicum*

Воздействует на ферментные окислительно-восстановительные системы.

*Nodus lymphaticus suis*

Общее стимулирующее воздействие; лимфатизм и экссудативный диатез.

*Tonsilla suis*

Общее стимулирующее воздействие; хронический тонзиллит, гипертрофия миндалин, лимфатизм.

*Medulla ossis suis*

Общее стимулирующее воздействие; остеомалация, хронический остеомиелит, экзостозы, анемические состояния.

*Funiculus umbilicalis suis*

Общее стимулирующее воздействие; заболевания соединительной ткани, остеохондроз, вертеброгенная невралгия, шейный синдром.

*Splen suis*

Активация функций селезенки и иммунной системы.

*Hypothalamus suis*

Стимулирующее воздействие на обмен веществ.

*Hepar suis*

Активация детоксикационных функций печени.

*Embryo suis*

Общее стимулирующее воздействие; атеросклероз, мышечная дистрофия.

*Cortex glandulae suprarenalis suis*

Стимуляция коры надпочечников.

*Pyrogenium-Nosode*

Тяжелые лихорадочные инфекции со склонностью к септическим состояниям.

*Cortisonum aceticum*

Нарушения функций надпочечников, передней доли гипофиза, соединительной ткани.

*Pulsatilla pratensis*

Кожные заболевания, склонность к простудам; воспаления и расстройства пищеварительного тракта; расстройства пищеварения; головные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.

*Acidum sarcolacticum*

Мышечные боли, состояния общей слабости и истощения; нарушения клеточного дыхания.

*Echinacea*

Поддерживающая терапия при тяжелых инфекциях (повышение иммунитета).

*Calcium phosphoricum*

Конституциональное средство при лимфатизме; состояния слабости, потеря аппетита, недостаток кальция.

*Aesculus hippocastanum*

Венозный стаз и его последствия; геморрой; боли в пояснично-крестцовой области.

*Kalium stibyltartaricum*

Воспаления нижних дыхательных путей, расстройства сердечно-сосудистой деятельности; рвота; воспаления мочевых органов; гнойные кожные заболевания; ревматические заболевания нижней части позвоночника.

*Solanum dulcamara*

Лихорадочные инфекции, воспаления дыхательных органов, пищеварительного тракта, мочевыводящих каналов, суставов и кожи, вызванные холодом и влагой.

*Levothyroxinum*

Стимуляция функций желез, мезенхимы и соединительной ткани; стимуляция процессов окисления в организме.

*Coccus cacti*

Воспаления носоглотки, дыхательных путей; маточные кровотечения; заболевания почек, почечнокаменная болезнь.

*Ferrum phosphoricum*

Лихорадочные воспалительные заболевания дыхательных путей.

*Gentiana lutea*

Расстройства пищеварения (например, хронический гастрит, метеоризм, диарея).

*Geranium robertianum*

Диарея, кровотечения, расстройства мочеиспускания; язвы, катары, скрофулез; заболевания желез; гипертрофия миндалин, включая глоточные миндалины.

*Mercurius solubilis Hahnemanni*

Воспаления слизистой оболочки дыхательных путей; кожные заболевания, воспаления миндалин, лимфатических желез и почек; болезни, сопровождающиеся истощением.

*Varium carbonicum*

Замедления развития у детей; хронические воспаления миндалин и верхних дыхательных путей.

*Conium maculatum*

Уплотнение желез; новообразования; депрессии.

*Galium aparine*

Почечнокаменная болезнь; язвы, особенно языка; преанцерозы.

### *Sulfur*

Различные, особенно хронические кожные заболевания; острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; состояния общей слабости, психические расстройства и депрессии; конституциональное и реакционное средство для повышения иммунитета.

### *Psorinum-Nosode*

Различные хронические кожные заболевания, хронические воспаления слизистых оболочек, особенно дыхательных путей; состояния общей слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний; головные боли, депрессии; повышенная чувствительность к холоду, морозу; склонность к переходу острых заболеваний в хронические.

## Траумель® С Traumeel® S

Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.  
Мазь гомеопатическая, 50 г.  
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.  
Раствор для внутримышечного и околосуставного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.



### **Состав:**

Капли: (на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Arnica montana D2 5 г, Calendula officinalis D2 5 г, Hamamelis virginiana D2 5 г, Achillea millefolium D3 5 г, Atropa belladonna D4 25 г, Aconitum napellus D3 10 г, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 10 г, Hepar sulfuris D8 10 г, Chamomilla recutita D3 8 г, Symphytum officinale D8 8 г, Bellis perennis D2 2 г, Echinacea angustifolia D2 2 г, Echinacea purpurea D2 2 г, Hypericum perforatum D2 1 г. *Вспомогательные компоненты:* этанола около 35% объемных.

Мазь: (на 100 г мази): *Активные компоненты:* Arnica montana D3 1,5 г, Calendula officinalis Ø, Hamamelis virginiana Ø по 0,45 г каждого, Echinacea angustifolia Ø, Echinacea purpurea Ø, Chamomilla Ø по 0,15 г каждого, Symphytum officinale D4, Bellis perennis Ø по 0,1 г каждого, Hypericum perforatum D6, Achillea millefolium Ø по 0,09 г, Aconitum napellus D1, Atropa belladonna D1 по 0,05 г каждого; Mercurius

*solubilis Hahnemanni D6 0,04 г; Hepar sulfuris D6 0,025 г. Вспомогательные компоненты:* основа гидрофильная, стабилизированная этанолом 12,5% объемных. Таблетки: (на 1 таблетку): *Активные компоненты:* Arnica montana D2 15 мг, Calendula officinalis D2 15 мг, Hamamelis virginiana D2 15 мг, Achillea millefolium D3 15 мг, Atropa belladonna D4 75 мг, Aconitum napellus D3 30 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30 мг, Hepar sulfuris D8 30 мг, Chamomilla recutita D3 24 мг, Symphytum officinale D8 24 мг, Bellis perennis D2 6 мг, Echinacea angustifolia D2 6 мг, Echinacea purpurea D2 6 мг, Hypericum perforatum D2 3 мг. *Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

Раствор для инъекций: (на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Arnica montana D2 2,2 мкл, Calendula officinalis D2 2,2 мкл, Hamamelis virginiana D1 0,22 мкл, Achillea millefolium D3 2,2 мкл, Atropa belladonna D2 2,2 мкл, Aconitum napellus D2 1,32 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar sulfuris D6 2,2 мкл, Chamomilla recutita D3 2,2 мкл, Symphytum officinale D6 2,2 мкл, Bellis perennis D2 1,1 мкл, Echinacea angustifolia D2 0,55 мкл, Echinacea purpurea D2 0,55 мкл, Hypericum perforatum D2 0,66 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

#### **Показания к применению:**

В комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и др.) и посттравматических состояний (отек мягких тканей после операций, вывихов, растяжений).

Раствор для инъекций: в комплексной терапии при вывихах, артрозах.

#### **Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Капли: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Из общих соображений не применять при системных заболеваниях, таких как туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянном склерозе, СПИДе, ВИЧ-инфекциях.

Таблетки: Из общих соображений не применять при системных заболеваниях, таких как туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянном склерозе, СПИДе, ВИЧ-инфекциях заболеваний.

Раствор для инъекций: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Не применять при туберкулезе, лейкозах, коллагенозах, рассеянном склерозе, СПИДе, ВИЧ-инфекциях и других аутоиммунных заболеваниях.

#### **Применение при беременности и лактации:**

Как и прочие лекарственные средства, гомеопатические препараты должны применяться в период беременности и кормления грудью только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Раствор для инъекций: По 1–2 ампулы 1–3 раза в неделю внутримышечно, околосуставно. Курс лечения 4–5 недель. Кратность и продолжительность введения препарата контролируется лечащим врачом. Примечание: рекомендуется одновременный прием нескольких лекарственных форм препарата (например, таблетки или капли вместе с мазью и инъекциями).

Капли: По 10 капель 3 раза в день, при отеках мягких тканей – по 30 капель 3 раза в день. Капли принимать за 15 минут до еды, развести в 1 чайной ложке воды и перед проглатыванием подержать во рту 1–2 минуты. Курс лечения: при посттравматических состояниях – 2 недели и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель. Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное использование мази Траумель С.

Мазь: Если не прописано иначе, то утром и вечером, при необходимости чаще, наносить мазь на беспокоящие участки. Выдавить столбик мази длиной в 4–5 см и втереть легкими движениями. Возможно наложение мазевой повязки. Курс лечения при посттравматических состояниях – 2 недели и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель. Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное использование капель или таблеток Траумель С.

Таблетки: Обычно по 1 таблетке 3 раза в день за 15 минут до еды рассасывать под языком. Курс лечения: при вывихах и растяжениях – 2 недели и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель.

**Побочное действие:**

Раствор для инъекций: Возможно повышенное слюноотделение после введения препарата. В этих случаях препарат следует отменить. При использовании препаратов, содержащих эхинацею и другие растения семейства Астровых, изредка наблюдаются кожные высыпания, зуд, в единичных случаях – отеки лица, одышка, головокружение и гипотония.

Капли: Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно повышенное слюноотделение после приема препарата. При их развитии необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Мазь: При применении мази в отдельных случаях могут наблюдаться кожные аллергические реакции.

Таблетки: Аллергические реакции. В редких случаях возможно повышенное слюноотделение после приема препарата. При их развитии необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обострять-

ся имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Arnica*

Кровотечения; миалгия после перенапряжения; заболевания артериальной и венозной систем.

*Calendula*

Плохо заживающиеся раны; рвано-ушибленные раны; обморожения и ожоги кожи.

*Hamamelis*

Варикозные расширения вен, геморрой, кровотечения из кожи и слизистых оболочек.

*Millefolium*

Кровотечения, боли при судорогах.

*Atropa belladonna*

Воспалительные заболевания с выраженной гипертермией, особенно кожи и суставов.

*Aconitum*

Острые воспалительные заболевания; болевой синдром.

*Mercurius solubilis Hahnemanni*

Воспаления слизистых оболочек; воспаления лимфатических желез; боли в костях, ревматизм.

*Hepar sulfuris*

Воспаления и нагноения кожи и слизистых оболочек.

*Chamomilla recutita*

Острые боли; состояния возбуждения, депрессии.

*Symphytum*

Поражения кости и надкостницы.

*Bellis perennis*

Кровотечения, кровоизлияния; мышечные боли, особенно после перенапряжения.

*Echinacea angustifolia*

Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (повышение иммунитета).

*Echinacea purpurea*

Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (повышение иммунитета).

*Hypericum*

Поражения периферической и центральной нервной системы.

## Убихинон композитум Ubichinon compositum

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.



### Состав:

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Ubichinonum D10 22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Vaccinium myrtillus D4 22 мкл, Colchicum autumnale D4 22 мкл, Podophyllum peltatum D4 22 мкл, Conium maculatum D4 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 22 мкл, Acidum sarcosolacticum D6 22 мкл, Hydrochinonum D8 22 мкл, Acidum DL-alpha-liponicum D8 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Manganum phosphoricum D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D8 22 мкл, Trichinoylum D10 22 мкл, Anthrachinonum D10 22 мкл, Naphthochinonum D10 22 мкл, para-Benzochinonum D10 22 мкл, Adenosinum triphosphoricum D10 22 мкл, Coenzym A D10 22 мкл, Galium aparine D6 22 мкл, Acidum acetylosalicylicum D10 22 мкл, Histamine D10 22 мкл, Nadidum D10 22 мкл, Magnesium gluconicum D10 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

### Показания к применению:

В комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организма; интоксикационного синдрома (в том числе, кахексия; инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием), нарушений обмена веществ (в том числе, атеросклероз, почечно- и желчнокаменная болезнь, подагра), абсолютного или относительного дефицита ферментов, витаминов; гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического стресса; последствий химио- и лучевой терапии.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).

### Способ применения и дозы:

Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Acidum ascorbicum*

Воздействует на функции окислительно-восстановительных ферментов.

*Thiaminum hydrochloricum*

Воздействует на функции ферментов (декарбоксилизация).

*Natrium riboflavinum phosphoricum*

Воздействует на функции ферментов (окислительно-восстановительные системы, флавопротеиды).

*Pyridoxinum hydrochloricum*

Воздействует на функции ферментов (декарбоксилазы, трансаминазы, дегидратазы, десульфгидразы).

*Nicotinamidum*

Воздействует на функции ферментов (дегидратазы).

*Vaccinium myrtillus*

Катаральные заболевания, энтерит, цистит, дистиреоз.

*Colchicum autumnale*

Острая и хроническая подагра, острый ревматизм, воспаления почек и органов желудочно-кишечного тракта.

*Podophyllum peltatum*

Нарушения функций печени и желчного пузыря.

*Conium maculatum*

Обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); опухания желез; новообразования в различных органах; депрессии.

*Hydrastis canadensis*

Нагноения слизистых оболочек с образованием язв; воспаления и колики пищеварительного тракта, печени и желчного пузыря; полипы.

*Galium aparine*

Почечнокаменная болезнь; язвы, особенно языка.

*Acidum sarcolacticum*

Мышечные боли; состояния общей слабости и истощения; нарушения клеточного дыхания.

*Hydrochinonum*

Антисептическое и противовоспалительное воздействие.

*Acidum DL-alpha-liponicum*

Кознзим при разложении пировиноградной кислоты, регулирует водно-солевой обмен.

*Sulfur*

Различные, особенно хронические кожные заболевания; зудящие экземы и нагноения кожи; острые и хронические воспаления; заболевания печени и органов пищеварения; бессонница, нервные расстройства; состояния слабости, депрессии; конституциональное и реакционное средство для повышения иммунитета.

*Manganum phosphoricum*

Состояния истощения при анемии; микроэлемент, необходимый для цикла лимонной кислоты.

*Natrium oxalacticum*

Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; иммунодефицитные состояния.

*Trichinoylum*

Регенерация заблокированных дыхательных ферментов; способствует детоксикации.

*Anthrachinonum*

Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации; гастроинтестинальные расстройства.

*Naphthochinonum*

Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации; после радиотерапии.

*para-Benzochinonum*

Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации; дерматозы.

*Ubichinonum*

Воздействует на промежуточный обмен веществ; способствует детоксикации, повышает иммунитет.

*Adenosinum triphosphoricum*

Поддержка систем, потребляющих энергию.

*Coenzym A*

Для трансацетилирования.

*Acidum acetylsalicylicum*

Расстройства пищеварительного тракта, кровотечения, шум в ушах; поражения соединительной ткани.

### *Histaminum*

Аллергические заболевания кожи и слизистой оболочки; низкое артериальное давление; боли в сердце.

### *Nadidum*

Биокатализатор, стимулирующий процессы окисления в дыхательной цепи.

### *Magnesium gluconicum*

Микроэлемент, воздействующий на функции ферментов цикла лимонной кислоты.

## **Хелидониум-Гомаккорд Н Chelidonium-Homaccord N**

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.



### **Состав:**

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Chelidonium majus D10 0,6 г, Chelidonium majus D30 0,6 г, Chelidonium majus D200 0,6 г, Atropa belladonna D10 0,3 г, Atropa belladonna D30 0,3 г, Atropa belladonna D200 0,3 г, Atropa belladonna D1000 0,3 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

### **Показания к применению:**

В качестве желчегонного средства в комплексной терапии хронического холецистита, хронических гепатитов с холестатическим компонентом.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

### **Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность терапии определяется врачом.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Chelidonium majus*

Воспалительные состояния гепатобилиарной системы, калькулезный холецистит, хронические заболевания печени и желчного пузыря.

*Atropa belladonna*

Острые воспалительные состояния желудочно-кишечного тракта.

## Хепель® Нереел

Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.

**Состав:**

(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

*Lycodium clavatum* D3 30 мг, *Chelidonium majus* D4 30 мг, *China* D3 30 мг, *Myristica fragrans* D4 30 мг, *Silybum marianum* D2 15 мг, *Phosphorus* D6 15 мг, *Veratrum album* D6 60 мг, *Citrullus colocynthis* D6 90 мг. *Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

**Показания к применению:**

В комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной и токсической этиологии.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и в период лактации:**

В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

**Способ применения и дозы:**

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком.  
Курс терапии 2–3 недели. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

**Побочное действие:**

Не выявлены.

**Передозировка:**

При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу или фармацевту.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Lycopodium clavatum*

Воспалительные и другие болезни гепатобилиарной системы.  
Расстройства пищеварения. Различные хронические и острые кожные болезни.  
Возрастные болезни. Патологические изменения поведения и настроения.

*China*

Острый понос. Расстройства пищеварения. Желчная колика. Общее истощение.  
Кожная сыпь.

*Chelidonium majus*

Воспалительные и другие хронические заболевания гепатобилиарной системы.  
Желчнокаменная болезнь.

*Silybum marianum*

Заболевания гепатобилиарной системы (в особенности застойные явления в системе воротной вены и венах малого таза); геморрой.

*Myristica fragrans*

Заболевания органов пищеварения с метеоризмом.

*Phosphorus*

Воспалительные поражения органов пищеварения. Тяжелые инфекции.  
Нарушения развития. Состояния истощения.  
Патология настроения и поведения.

*Veratrum album*

Нарастающая недостаточность сердечно-сосудистой системы при инфекционных заболеваниях. Поносы, невралгии. Невротические расстройства с повышенной возбудимостью.

*Citrullus colocynthis*

Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы.

## Цель® Т Zeel Т

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы 2,2 мл.  
Мазь гомеопатическая, 50 г.  
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.

**Состав:**

Раствор для инъекций: (на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Cartilago suis D6 2,2 мг, Funiculus umbilicalis suis D6 2,2 мг, Embryo totalis suis D6 2,2 мг, Placenta totalis suis D6 2,2 мг, Solanum dulcamara D3 11,0 мг, Symphytum officinale D6 11,0 мг, Nadidum D8 2,2 мг, Coenzym A D8 2,2 мг, Sanguinaria canadensis D4 3,3 мг, Natrium diethyloxalaceticum D8 2,2 мг, Acidum DL- $\alpha$ -liponicum) D8 2,2 мг, Toxicodendron quercifolium D2 11,0 мг, Arnica montana D4 220,0 мг, Sulfur D6 3,96 мг. *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

Мазь: (на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Cartilago suis D2 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis D2 0,001 г, Embryo suis D2 0,001 г, Placenta suis D2 0,001 г, Rhus toxicodendron D2 0,27 г, Arnica montana D2 0,3 г, Solanum dulcamara D2 0,075 г, Symphytum officinale D8 0,75 г, Sanguinaria canadensis D2 0,225 г, Sulfur D6 0,27 г, Nicotinamid-adenin-dinucleotid D6 0,01 г, Coenzym A D6 0,01 г, Acidum DL- $\alpha$ -liponicum D6 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum D6 0,01 г, Acidum silicicum D6 1,0 г. *Вспомогательные компоненты:* гидрофильная мазь, стабилизированная этанолом 12,5% объемных.

Таблетки: (на 1 таблетку): *Активные компоненты:* Cartilago suis D4 0,3 мг, Funiculus umbilicalis suis D4 0,3 мг, Embryo suis D4 0,3 мг, Placenta suis D4 0,3 мг, Rhus toxicodendron D2 0,54 мг, Arnica montana D1 0,6 мг, Solanum dulcamara D2

0,15 мг, *Symphytum officinale* D8 0,15 мг, *Sanguinaria canadensis* D3 0,45 мг, *Sulfur* D6 0,54 мг, *Nicotinamid-adenin-dinucleotid* D6 0,03 мг, *Coenzym A* D6 0,03 мг, *Natrium oxalaceticum* D6 0,03 мг, *Acidum silicicum* D6 3,0 мг, *Acidum DL- $\alpha$ -lipoicum* D6 0,03 мг. *Вспомогательные компоненты*: магния стеарат, лактоза.

**Показания к применению:**

Комплексная терапия артрозов.

Раствор для инъекций: В комплексной терапии артрозов различной этиологии, спондилартрозов и плечелопаточных периартритов.

**Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Раствор для инъекций: Повышенная индивидуальная чувствительность, особенно к *Rhus toxicodendron* и растениям семейства Астровых.

Мазь: Кожные заболевания, нарушения целостности кожных покровов в местах нанесения мази.

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Раствор для инъекций: Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) внутримышечно 2 раза в неделю. Средний курс лечения составляет 4–5 недель. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Мазь: Если не прописано иначе, то утром и вечером наносить мазь на пораженные места в области сустава. Выдавить столбик мази длиной в 4–5 см и втереть легкими движениями. Возможно наложение мазевой повязки. Курс лечения при артрозах – 5–10 недель, при спондилартрозе и плечелопаточном периартрите – около 4 недель.

Таблетки: Обычно по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком.

Курс лечения: при артрозах и гонартрозах – 5–10 недель; при спондилартрозе и плечелопаточном периартрите – около 4 недель.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. При их развитии следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Раствор для инъекций: В случаях непереносимости сумаха (*Rhus toxicodendron*) и растений семейства Астровых крайне редко может развиваться анафилактическая реакция.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу. Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное применение и других лекарственных форм препарата (раствора для инъекций Цель Т, таблеток подъязычных Цель Т), а также препарата Траумель С.

**Ингредиенты и показания к ним:***Cartilago suis*

Стимулирующая терапия при поражениях хрящевых структур суставов.

*Funiculus umbilicalis suis*

Поражения соединительной ткани, нарушения кровоснабжения.

*Embryo totalis suis*

Стимулирует кровоснабжение.

*Placenta totalis suis*

Способствует кровоснабжению.

*Rhus toxicodendron*

Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, связках и мышцах.

*Arnica*

Различные кровотечения; миалгия после перенапряжения; заболевания артериальной и венозной системы.

*Solanum dulcamara*

Воспаления суставов, вызванные холодом и влагой.

*Symphytum officinale*

Поражения костей и надкостницы.

*Sanguinaria canadensis*

Ревматизм (мышц, мягких тканей, суставов).

*Sulfur*

Ревматические заболевания, бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.

*Acidum silicicum*

Общая слабость и поражения соединительной ткани, связочного аппарата.

*Nadidum*

Стимуляция конечного окисления в дыхательной цепи; катализатор для окислительно-восстановительных процессов в цепи молочная кислота – пировиноградная кислота, имеющих огромное значение для процессов обмена веществ в суставах.

### *Coenzym A*

Для трансацетилирования.

### *Acidum DL- $\alpha$ -liponicum*

Воздействует на обмен веществ; способствует водно-электролитному обмену, разложению пировиноградной кислоты в "активированную уксусную кислоту".

### *Natrium diethyloxalaceticum*

Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; чувствительность к холоду и влаге.

## Церебрум композитум® Н Cerebrum compositum® Н

Раствор для инъекций  
гомеопатический,  
ампулы 2,2 мл.



### **Состав:**

(на одну ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Cerebrum suis D8, Embryo suis D10, Hepar suis D10, Placenta suis D10, Kalium phosphoricum D6, Selenium D10, Thuja D6, Ignatia D8, Bothrops lanceolatus D10, Acidum phosphoricum D10, China D4, Sulfur D10, Kalium bichromicum D8, Gelsemium D4, Ruta D4, Arnica montana D28, Aesculus D4, Manganum phosphoricum D8, Magnesium phosphoricum D10, Anacardium D6, Conium D4, Medorrhinum-Nosode D13, Hyoscyamus D6, Aconitum napellus D6, Coccus D4, Ambra D10 по 22 мкл. *Вспомогательные компоненты:* натрия хлорид для изотонии, вода для инъекций.

### **Показания к применению:**

Энцефалопатия различного генеза, в том числе при старении (расстройство памяти, внимания); стимуляция процессов регенерации и неспецифического иммунитета.

### **Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. В связи с отсутствием клинических данных применение у детей не рекомендуется.

### **Применение при беременности и лактации:**

Применять во время беременности и в период лактации только после предварительной консультации с лечащим врачом.

### **Способ применения и дозы:**

1–3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, внутривожно, подкожно. Курс лечения – 4–6 недель. Возможны повторные курсы лечения после согласования с лечащим врачом.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:***Cerebrum suis*

Состояния психического истощения. Нарушения развития. Расстройства церебрального кровообращения с последующими нарушениями церебральных функций.

*Embryo suis*

Неспецифическая стимуляция защитных систем организма. Атеросклероз.

*Hepar suis*

Стимуляция детоксикационных функций печени.

*Placenta suis*

Расстройства периферического кровообращения.

*Kalium phosphoricum*

Депрессивные состояния и состояния истощения. Состояния после физического или эмоционального перенапряжения и перенесенных тяжелых заболеваний.

Кроме того, бессонница с последующей дневной вялостью. Снижение памяти.

*Selenium*

Желудочно-кишечные расстройства. Общая слабость. Кроме того, забывчивость, нарушение концентрации внимания.

*Thuja*

Желудочно-кишечные расстройства. Снижение настроения. Расстройства речи.

*Ignatia*

Нервные расстройства. Снижение настроения. Спазмы полых органов и судороги мышц.

*Bothrops lanceolatus*

Кровотечения, нарушения свертываемости крови. Заболевания сосудов.

Кроме того, расстройства речи и памяти.

*Acidum phosphoricum*

Состояния физического и психического истощения.

*China*

Анемия. Общее истощение. Невралгии.

*Manganum phosphoricum*

Снижение памяти. Состояния истощения с анемией. Потребность в микроэлементах, особенно при ферментативных нарушениях цикла Кребса.

*Magnesium phosphoricum*

Невралгии. Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта.

*Anacardium*

Расстройства пищеварения. Психическое истощение. Расстройства настроения. Бред.

*Conium*

Кальциноз церебральных сосудов (церебросклероз с головокружениями гипоксического генеза). Параличи. Новообразования различной локализации. Расстройства настроения.

*Medorrhinum-Nosode*

Расстройства поведения (эксцентричность). Преждевременное старение. Кроме того, снижение памяти (в особенности кратковременной), нервозность, головные боли.

*Hyoscyamus*

Беспокойство и раздражительность. Расстройства сна. Спастические состояния органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

*Aconitum*

Нервные заболевания с невралгиями. Острые расстройства сердечной деятельности с приступами страха.

*Cocculus*

Головокружения различного генеза. Кальциноз сосудов головного мозга (церебросклероз). Боли в затылке. Судороги и нервные состояния, в том числе в результате дефицита сна.

*Ambra*

Синдром раздражительной слабости и нервного истощения. Расстройства сна. Вегетативные расстройства. Подавленное настроение. Кальциноз сосудов. Преждевременное старение.

*Sulfur*

Сердечно-сосудистые болезни, нарушения артериального давления. Расстройства сна, невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и настроения.

*Kalium bichromicum*

Воспаления слизистых дыхательных и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта. Гнойничковые болезни кожи. Невралгии. Ревматизм. Кроме того, периодические боли в лобной области.

*Gelsemium*

Цефалгии. Невротические расстройства. Параличи и судороги.

*Ruta*

Состояния физического перенапряжения (например, головные боли и астенопия после зрительного перенапряжения).

*Arnica*

Любые кровотечения. Миалгии после нагрузок. Болезни артерий и вен.

*Aesculus*

Нарушения венозного кровотока. Геморрой. Пояснично-крестцовые боли.

**Швевф-Хель**  
**Schwef-Heel**Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл**Состав:**(на 100 г): *Активные компоненты:* Sulfur D4 20 г, Sulfur D6 20 г, Sulfur D12 20 г, Sulfur D30 20 г, Sulfur D200 20 г.

Вспомогательные компоненты: этанол около 85% (объемных).

**Показания к применению:**

Препарат зарегистрирован в РФ без показаний к применению, применяется по назначению врача.

**Ингредиенты и показания к ним:***Sulfur*

Различные, особенно хронические заболевания кожи, зудящая экзема и гнойничковые заболевания кожи. Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Нарушения функций печени. Невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и восприятия. Кроме того, конституциональное средство, стимулирующее иммунитет.

**Энгистол®**  
**Engystol®**Таблетки подъязычные  
гомеопатические, 50 шт.**Состав:**(на 1 таблетку): *Активные компоненты:*

Vincetoxicum hirundinaria D6 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria

D30 75 мг, Sulfur D4 37,5 мг, Sulfur D10 37,5 мг. *Вспомогательные компоненты:* магния стеарат, лактоза.

**Показания к применению:**

Применяется в комплексной терапии простудных заболеваний и гриппозных состояний (лихорадка, общая слабость, головная боль, насморк) в качестве средства, активирующего неспецифические защитные механизмы организма.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 3-х лет). В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. Курс лечения – 2–3 недели.

При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Vincetoxicum hirsutum*

Вирусные инфекции. Кроме того, снижение клеточного иммунитета с симпатикотоническими реакциями сосудов.

### *Sulfur*

Различные, особенно хронические заболевания кожи, зудящая экзема и гнойничковые болезни кожи. Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Нарушения функций печени. Невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и восприятия. Кроме того, конституциональное средство, стимулирующее иммунитет.

## Эскулюс композитум *Aesculus compositum*

Капли для приема внутрь  
гомеопатические, 30 мл.



### **Состав:**

(на 100 г препарата): *Активные компонен-*

*ты:* *Aesculus hippocastanum* D1 10 г, *Secale*

*cornutum* D3 1 г, *Viscum album* D2 1 г,

*Nicotiana tabacum* D10 1 г, *Solanum nigrum*

D6 1 г, *Arnica montana* D3 1 г, *Echinacea* D2 1

г, *Baptisia tinctoria* D4 1 г, *Rhus toxicodendron* D4 1 г, *Cuprum metallicum* D13 1 г,

*Ruta graveolens* D4 1 г, *Solanum dulcamara* D4 1 г, *Colchicum autumnale* D4 1 г,

*Barium jodatatum* D6 1 г, *Hamamelis virginiana* D4 1 г, *Apis mellifica* D4 1 г, *Acidum*

*benzoicum e resina* D4 1 г, *Eupatorium cannabinum* D3 1 г, *Arteria suis* D10 1 г,

*Natrium pyruvicum* D8 1 г. *Вспомогательные компоненты:* этанол около 35% (объемных).

### **Показания к применению:**

Препарат применяется в комплексной терапии нарушений периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, атеросклероз, варикозное расширение вен).

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в частности, *Rhus toxicodendron*, *Arnica*, *Echinacea*), беременность, детский возраст (до 18 лет), прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания), диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы), СПИД и ВИЧ-инфекция.

### **Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Препарат принимают внутрь по 10 капель, предварительно разведенных в 30 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При обострении заболевания принимают по 10 капель каждые 15 минут (в течение 2 часов). Курс лечения до 5 недель. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

В состав препарата входит йодсодержащий компонент. При заболеваниях щитовидной железы с повышенной чувствительностью к йоду не следует применять Эскулюс композитум без предварительной консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:**

*Aesculus hippocastanum*

Венозный стаз и связанные с ним заболевания. Геморрой.

*Secale cornutum*

Спастические состояния матки (дисменорея), нарушения кровообращения при заболеваниях артерий, склонность к кровотечениям.

*Viscum album*

Высокое или низкое артериальное давление, головокружение. Сужение коронарных сосудов сердца и нарушения сердечного ритма. Болезнь износа суставов (также флебартоз).

*Nicotiana tabacum*

Пониженное артериальное давление. Стенокардия. Кроме того, болезнь Бюргера-Виннивартера, ангиоспазмы (болезнь Рейнольда), перемежающая хромота.

*Solanum nigrum*

Симптомы раздражения мозговых оболочек. Кроме того, энцефаломалация, дезориентация, оцепенение.

*Arnica montana*

Заболевания артерий и вен.

*Echinacea*

Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с высокой температурой (стимуляция защитных механизмов).

*Baptisia tinctoria*

Тяжелые инфекционные заболевания с лихорадкой. Спутанность сознания, разбитость.

*Rhus toxicodendron*

Инфекционные болезни с температурой и оцепенением. Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях и мышцах. Повышенная раздражительность и возбудимость, усиливающиеся в сырую холодную погоду.

*Cuprum metallicum*

Эпилепсия. Судороги скелетной и гладкой мускулатуры, спазмы сосудов, в том числе сосудов сердца.

*Ruta graveolens*

Физическое перенапряжение. Варикозное расширение вен.

*Solanum dulcamara*

Инфекция с температурой. Воспалительные процессы дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, суставов, кожи, обусловленные переохлаждением в сырую погоду ("влажнопогодное средство").

*Colchicum autumnale*

Подагра в острой или хронической стадии. Острый суставной ревматизм. Тендовагинит.

*Barium jodatatum*

Повышенное артериальное давление и обызвествление сосудов (церебросклероз).

*Hamamelis virginiana*

Варикозное расширение вен. Геморрой. Кровоточивость слизистых и кожных покровов.

*Apis mellifica*

Воспалительные процессы, а также заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях или полостях (также общая отечность). Аллергия.

*Acidum benzoicum e resina*

Ревматические, подагрические заболевания, например, мочекислый диатез) и дегенеративные заболевания суставов.

*Eupatorium cannabinum*

Гриппозные состояния с лихорадкой.

*Arteria suis*

Нарушения артериального кровообращения, в том числе при сахарном диабете; узелковый периартериит, болезнь Бюргера-Виннивартера, перемежающая хромота, судороги икроножных мышц, склонность к гангрене.

*Natrium pyruvicum*

Расстройства периферического кровообращения (при сахарном диабете) с тенденцией к озноблению (обморожения), трофические язвы и гангрена.

## Эуфорбиум композитум Назентропфен С Euphorbium compositum Nasentropfen S

Спрей назальный  
гомеопатический, 20 мл.



### Состав:

(на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Euphorbium D4 1 г, Pulsatilla pratensis D2 1 г, Luffa operculata D2 1 г, Mercurius bijodatus D8 1 г, Mucosa nasalis suis D8 1 г, Hepar sulfuris D10 1 г, Argentum nitricum D10 1 г, Sinusitis-Nosode D13 1 г. *Вспомогательные компоненты:* бензалкония хлорид около 0,01%, вода для инъекционных растворов, натрия хлорид для изотонии.

### Показания к применению:

Риниты различной этиологии, хронические синуситы.

### Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### Применение при беременности и в период лактации:

Как и прочие лекарственные средства, гомеопатические препараты должны применяться в период беременности и кормления грудью только после предварительной консультации с врачом.

### Способ применения и дозы:

Впрыскивают по 1–2 дозы в каждую ноздрю 3–5 раз в день.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу или фармацевту.

**Ингредиенты и показания к ним:***Euphorbium*

Воспалительные заболевания дыхательных путей (особенно верхних: риниты и синуситы). Евстахеит и водянка среднего уха.

*Pulsatilla pratensis*

Воспалительные заболевания дыхательных путей, склонность к простудным заболеваниям. Конъюнктивит. Воспаления среднего уха. Корь. Цефалгия. Невротические расстройства, нарушения настроения.

*Luffa operculata*

Насморк. Сенной насморк.

*Mercurius bijodatus*

Гнойное воспаление слизистой носа, зева, миндалин и конъюнктивы.

*Mucosa nasalis suis*

Хронический ринит, полисинусит. Озена. Полипы носа. Заболевания придаточных пазух.

*Hepar sulfuris*

Гнойное воспаление слизистых, хроническое гнойное воспаление среднего уха, тонзиллярный абсцесс. Предрасположенность к заболеваниям лимфатической системы. Нервозность.

*Argentum nitricum*

Мигрень. Хронические заболевания слизистых.

*Sinusitis-Nosode*

Рецидивирующие синуситы.

## Эхинацея композитум СН *Echinacea compositum SN*

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы 2,2 мл.

**Состав:**

(на 1 ампулу 2,2 мл): *Активные компоненты:* Echinacea D3 22 мкл, Aconitum napellus D3 22 мкл, Sanguinaria canadensis D4 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Baptisia tinctoria D4 22 мкл, Lachesis mutus D10 22 мкл, Bryonia cretica D6 22 мкл, Eupatorium perfoliatum D6 22 мкл, Pulsatilla pratensis D8 22 мкл, Hydrargyrum bichloratum D8 22 мкл, Thuja occidentalis D8 22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл, Cortisonum aceticum D13 22 мкл, Streptococcus haemolyticus-Nosode D18 22

мкл, Staphylococcus-Nosode D18 22 мкл, Phytolacca americana D6 22 мкл, Zincum metallicum D10 22 мкл, Gelsemium sempervirens D6 22 мкл, Hepar sulfuris D10 22 мкл, Toxicodendron quercifolium D4 22 мкл, Arnica montana D4 22 мкл, Acidum arsenicosum D8 22 мкл, Argentum nitricum D8 22 мкл, Euphorbium D6 22 мкл.

*Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.

**Показания к применению:**

Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов дыхания, мочеполовых путей, кожи и др.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к растениям семейства Asteraceae или к растениям рода Rhus семейства Anacardiaceae. Прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания), диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы), СПИД и ВИЧ-инфекция, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

**Применение при беременности и лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

При использовании препаратов эхинацеи наблюдались случаи высыпаний на коже, зуда, редко – отека лица, удушья, головокружения и падения артериального давления.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).

В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

**Ингредиенты и показания к ним:***Echinacea*

Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (стимуляция клеточного иммунитета).

*Aconitum napellus*

Острые лихорадочные состояния. Острые сердечные приступы.

*Sanguinaria canadensis*

Мигрень. Воспалительные заболевания дыхательных путей. Ревматизм.

*Sulfur*

Различные, особенно хронические, заболевания кожи, зудящая экзема и гнойничковые болезни кожи. Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Нарушения функций печени. Невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и восприятия. Кроме того, конституциональное средство, стимулирующее иммунитет.

*Baptisia tinctoria*

Тяжелые лихорадочные инфекции. Общее детоксикационное действие на кровь (сепсис, септицемия, понижение иммунитета). Спутанность сознания.

*Lachesis mutus*

Воспаления и кровоточивость слизистых. Нарушения функций желез. Инфекционные болезни. Проведение общей детоксикационной терапии системы крови. Воспаления вен. Стенокардия. Сердечно-сосудистая недостаточность. Невралгии. Ревматизм. Судороги. Парезы. Нарушения поведения и восприятия.

*Bryonia cretica*

Острые воспалительные заболевания органов дыхания, плевры, брюшины, печени. Острые и хронические ревматические заболевания.

*Eupatorium perfoliatum*

Грипп и гриппозные инфекции с лихорадкой. Заболевания гепатобилиарной системы. Ревматизм.

*Pulsatilla pratensis*

Кожные болезни. Воспалительные заболевания дыхательных путей, склонность к простудным заболеваниям. Нарушения функций желудочно-кишечного тракта, в том числе при воспалениях. Патология женских половых органов, в том числе воспалительного характера. Вагиниты с выделениями. Циститы с нарушением опорожнения мочевого пузыря. Ревматические болезни. Воспалительные заболевания глаз, уха. Корь. Эпидемический паротит. Цефалгии. Нервно-психические расстройства. Расстройства сна. Нарушения поведения.

*Hydrargyrum bichloratum*

Острый конъюнктивит. Острые воспаления слизистой оболочки рта, миндалин, толстого кишечника, почек, мочевыводящих путей, влагалища.

*Thuja occidentalis*

Болезни кожи и слизистых. Расстройства пищеварения. Ревматизм.

*Phosphorus*

Воспалительные заболевания органов дыхания, пищеварения, мочеполовых органов. Тяжелые инфекционные заболевания. Нарушения развития и состояния истощения. Боли в сердце, болезни миокарда. Кровотечения. Ревматизм. Невралгии и цефалгии. Повышенная чувствительность органов чувств; глазные болезни. Нарушения поведения и настроения.

*Cortisonum aceticum*

Патология надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани.

*Streptococcus haemolyticus-Nosode*

Заболевания, вызываемые стрептококками, например, ангина, мышечно-суставной ревматизм, нефрит, эндокардит.

*Staphylococcus-Nosode*

Заболевания, вызываемые стафилококками, например, ячмень, блефарит, фурункул, угри, цистопиелит, остеомиелит, воспаление среднего уха.

*Phytolacca americana*

Острые инфекционные состояния с лихорадкой. Воспалительные заболевания слизистых, в особенности, дыхательных путей, а также грудных желез. Ревматические заболевания.

*Zincum metallicum*

Судороги и невралгии. Болезни позвоночника, головного и спинного мозга. Состояния истощения. Нарушения настроения. Расстройства сна.

*Gelsemium sempervirens*

Цефалгии. Невротические расстройства. Инфекционные болезни. Параличи и судороги.

*Hepar sulfuris*

Гнойные воспаления кожи и слизистых (фурункулы, отит, тонзиллярный абсцесс). Предрасположенность к заболеваниям лимфатической системы. Раздражительность.

*Toxicodendron quercifolium*

Кожные болезни с зудом. Острые инфекционные состояния с оцепенением. Воспалительные заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, глаз. Расстройства менструального цикла. Цефалгии. Невралгии. Параличи. Головокружения. Боли ревматического генеза в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях и мышцах. Последствия травм, перенапряжения. Состояния страха, беспокойства и нарушения настроения.

*Arnica montana*

Кровотечения различного генеза. Миалгии после перенапряжения. Заболевания вен и артерий.

*Acidum arsenicosum*

Воспалительные процессы различной степени тяжести и локализации. Тяжелые инфекции. Нарушения настроения.

*Argentum nitricum*

Болезни пищеварения. Мигрень. Кроме того, нормализация функций слизистых.

*Euphorbium*

Острые воспаления кожи, дыхательных путей (в особенности верхних – риниты, синуситы).